

сосѣднее плато, тѣ же рѣчки текутъ нѣсколько спокойнѣе, а ихъ ущелья, вырытыя въ наносной почвѣ, дѣлаются шире, и достигаютъ страшной глубины—не менѣе какъ въ тысячу футовъ, иногда же и болѣе; при томъ, всѣ эти ущелья несутъ одинаковый характеръ. Со стороны лугового плато подобная пропасть часто незамѣтна, пока не подойдешь къ самому ея берегу. Здѣсь сначала на нѣсколько десятковъ сажень, а иногда и болѣе, идетъ довольно пологій наклонъ, за которымъ слѣдуютъ отвѣсные обрывы, изборожденные поперечными трещинами. Эти обрывы имѣютъ обыкновенно отъ 300—500 фут. и даже болѣе по вертикалу; за ними почти всегда расположенъ крутой скатъ, нерѣдко оканчивающійся у самой рѣчки вторичнымъ обрывомъ, но уже гораздо меньшихъ размѣровъ. Оголенные стѣны обрывовъ состоятъ изъ глины или песка съ галькою и мелкими валунами; мѣстами глина замѣняется прослойками чистаго песка; мѣстами слои, болѣе или менѣе толстые, состоятъ изъ одной лёссовой глины. Все это подвергается сильному вывѣтриванію и разложенію. Камни съ отвѣсныхъ стѣнъ безпрестанно валятся внизъ, въ особенности при вѣтрѣ или послѣ дождя и снѣга; часто случаются также обвалы, довольно большіе. Вслѣдствіе того береговые обрывы описываемыхъ ущелій представляютъ причудливыя формы башенъ, столовъ, стѣнъ, пирамидъ и т. п.; боковыя перпендикулярныя трещины, или балки, обыкновенно недлины, очень узки и недоступны. Только изрѣдка по болѣе широкимъ и пологимъ изъ нихъ проложены мѣстными тангутами тропинки, ведущія на дно ущелій. Здѣсь, по широкой полосѣ голыхъ валуновъ, съ шумомъ бѣгутъ рѣчки, на берегахъ которыхъ, то справа, то слѣва, являются островки лѣсовъ изъ тополя, облепихи и лозы. По дну же верхнихъ поперечныхъ балокъ, и преимущественно на сѣверной сторонѣ крутыхъ боковыхъ скатовъ крайнихъ стѣнъ ущелій, обыкновенно растутъ кустарники (акація, барбарисъ, шиповникъ, жимолость, кизиль, смородина, рябина), образующіе густѣйшія заросли. Въ верхнихъ частяхъ тѣхъ же ущелій, поближе къ горамъ, листовенныя деревья замѣняются елью и древовиднымъ можжевельникомъ. Въ этихъ хвойныхъ лѣсахъ, а еще болѣе въ кустарныхъ заросляхъ, или даже на открытыхъ боковыхъ скатахъ ущелій, встрѣчается разнообразная травянистая флора, весьма схожая съ флорою сосѣднихъ горъ, но совершенно отличная отъ степной флоры ближайшихъ плато. Таковая разница встрѣчается и въ фаунѣ, которая въ описываемыхъ ущельяхъ опять-таки много сходствуетъ съ фауною сосѣднихъ горъ. Но объ этомъ рѣчь впереди. Теперь же перейдемъ къ описанію самой Желтой рѣчки въ изслѣдованномъ нами районѣ ея верхняго теченія.