

и животная жизнь скучивается къ рѣкѣ; но и здѣсь является далеко не въ обилии. Пять, шесть видовъ кустарниковъ, перечисленныхъ въ началѣ настоящей главы, образуютъ мѣстами довольно густыя заросли, между которыми, поближе къ рѣкѣ, поднимаются островками небольшія рощи *тополей* (*Populus Przewalskii*, n. sp.). Въ этихъ рощахъ и кустарникахъ, какъ вообще на лёссовой почвѣ Центральной Азіи, нѣтъ ни луговъ ни зеленаго дерна—одна голая глина, или занесенный пылью валежникъ. Только возлѣ рѣдкихъ ключей попадаются небольшія зеленѣющія площадки; мѣстами, тамъ гдѣ просачивается подпочвенная вода, образуются небольшія болота, на которыхъ растутъ кой-какія болотныя травы, мелкій тростникъ и касатикъ, а по окраинамъ—рѣдкій дырисунь. Даже и травянистая флора описываемой части долины верхней Хуань-хэ очень и очень бѣдная, какъ то оказалось впоследствии, въ концѣ мая, слѣдовательно въ лучшій періодъ растительной жизни.

Бѣдна также здѣсь и фауна. Крупныхъ звѣрей нѣтъ вовсе; изъ другихъ водятся лишь *волки* (*Canis lupus*), *лисицы* (*Canis vulpes*) и *зайцы* (*Lepus* sp.), да мелкіе *грызуны*. Изъ осѣдлыхъ птицъ всего болѣе *хый-ла-по* (*Pterorhinus Davidi*) и *голубыхъ сорокъ* (*Pica cyanea*); обыкновенны также по кустарникамъ синицы трехъ видовъ—*Parus flavpectus*, *Poecile affinis*, *Orites calvus* n. sp., *дятлы* (*Picus mandarinus*) и *полевые воробьи* (*Passer montanus*); изрѣдка попадаютъ *фазаны* (*Phasianus Strauchi*). Пролетныхъ видовъ, въ послѣдней трети марта, мы застали также немного; только *журавли* (*Grus sinerea*, чаще *G. virgo*) стадо за стадомъ высоко неслись къ сѣверу; за ними слѣшили *даурскія галки* (*Monedula daurica*), *коршуны* (*Milvus melanotis*) и *водяныя щеврицы* (*Anthus aquaticus*). Кромѣ этихъ видовъ и *баклановъ* (*Phalacrocorax carbo*) по рѣкѣ, пролетныхъ пернатыхъ встрѣчалось очень мало; даже *утки* (*Anas boschas*, *A. querquedula*, *A. cresea*), *турпаны* (*Casarca rutila*) и *стѣрые гуси* (*Anser sinereus*) попадались лишь изрѣдка, да и то большею частію оставшіеся для вывода молодыхъ; еще рѣже были *черношейные журавли* (*Grus nigricollis*), гнѣздящіеся здѣсь на самыхъ миниатюрныхъ болотахъ. Вообще пролетныя птицы, по крайней мѣрѣ водяныя и голенастыя, за исключеніемъ немногихъ видовъ, вѣроятно, лишь въ маломъ числѣ появляются на верхней Хуань-хэ, подобно тому, какъ и на Куку-норѣ.

Ихтиологическая фауна описываемой части Желтой рѣки довольно разнообразна. Всего, какъ теперь, такъ и впоследствии, нами поймано