

въ верхней Хуань-хэ и ея притокахъ 13 или 14 видовъ рыбъ <sup>1)</sup>, принадлежащихъ къ пяти родамъ: *Schizopygopsis*, *Nemachilus*, *Diplophysa*, *Squalius* и *Diptychus*. Изъ общаго числа добытыхъ видовъ только 3 были прежде извѣстны и описаны, а именно: *Schizopygopsis Przewalskii*, *Nemachilus Stoliczkae* и *Squalius chuanchicus*. Послѣдній является единственнымъ представителемъ рыбъ, свойственныхъ какъ верхнему, такъ и среднему (въ Ордосѣ) <sup>2)</sup> теченію той же Желтой рѣки.

Состояніе  
погоды.

Не смотря на раннюю еще пору года, именно на послѣднюю треть марта, погода въ описываемой части Хуань-хэ, вслѣдствіе значительнаго пониженія мѣстности и голыхъ глинистыхъ или песчаныхъ окрестностей, сильно нагрѣваемыхъ въ ясные дни, стояла теплая, по временамъ даже жаркая. Термометръ въ 1 ч. пополудни поднимался до + 25,3°; Желтая рѣка уже давно очистилась отъ льда и температура ея воды доходила до + 8,0°, въ мелкихъ же заливахъ и рукавахъ до + 14,0°; 23-го марта шелъ первый дождь; 24-го гремѣлъ первый громъ; 25-го найденъ цвѣтокъ одуванчика; тремя днями ранѣе того прилетѣли *ласточки* (*Cotyle rupestris*). Къ концу описываемаго мѣсяца листья на кустарникахъ—облепихѣ, барбарисѣ и лозѣ начали распускаться; на мокрыхъ лужайкахъ трава къ этому времени уже порядочно зеленѣла. Но рядомъ съ такими проявленіями дружной весны, нерѣдко перепали холода и шолъ снѣгъ, въ особенности на горахъ, а утренніе морозы доходили до —7,8°. Сухость воздуха вообще была очень велика, даже на самомъ берегу Желтой рѣки. При томъ, какъ днемъ, такъ и ночью, часто случались бури, обыкновенно являвшіяся вдругъ, порывами, и иногда быстро измѣнявшія свое направленіе съ восточнаго на западное. Бури эти всегда приносили тучи пыли, которая густо наполняла атмосферу, такъ что всходившее или заходившее солнце то вовсе не было видно, то являлось блѣднымъ дискомъ, какъ луна; небо же казалось сѣрымъ, сумрачнымъ. Тяжело дышалось подобнымъ воздухомъ; грустно становилось на сердцѣ при видѣ такого безобразія природы; тѣмъ болѣе, что кипучей весенней жизни нигдѣ замѣтно не было; даже пѣнія птицъ почти не слышалось. Только въ кустарныхъ заросляхъ голубыя сороки своимъ трещаньемъ, а хый-ла-по гром-

<sup>1)</sup> Кромѣ того три вида—*Squaliobarbus curricus*, *Nemachilus robustus*, *Schizopygopsis Pylzowi*—добыты были нами въ 1872 и 1873 гг. въ притокахъ той же верхней Хуань-хэ въ восточномъ Нань-шанѣ (въ горахъ Гань-су). См. «Монг. и стр. Тангутовъ», т. II. Ихтиологическій отдѣлъ обраб. профессоромъ Кесслеромъ.

<sup>2)</sup> Тамъ нами добыто лѣтомъ 1871 г. всего 5 видовъ рыбъ: *сомъ* (*Silurus asotus*), *кариъ* (*Cyprinus carpio*), *карась* (*Carassius Langsdorfii*), *голавль* (*Squalius chuanchicus*) и *Мегалобіо насутусъ*. «Монг. и стр. Танг.» т. II. Ихтиологич. отд. обр. проф. Кесслеромъ.