

риною, но лежитъ на тысячу слишкомъ футовъ ниже поверхности со-
сѣдняго плато. Верхніе отвѣсныя бока этого ущелья изрѣзаны глубо-
кими поперечными балками и сильно разрушаются подъ вліяніемъ мо-
розовъ, бурь и атмосферныхъ осадковъ. Тамъ же, гдѣ боковые скаты,
заполняемые верхними осыпями, становятся только болѣе или менѣе
крутыми, равно какъ иногда по дну боковыхъ балокъ, густо растутъ,
преимущественно на сѣверныхъ сторонахъ, кустарники: *сибирская акація*
(*Caragana frutescens*), *шиповникъ* (*Rosa* sp.), *кизильникъ* (*Cotoneaster* sp.),
барбарисъ (*Berberis vulgaris*, *B. chinensis*), *тавола* (*Spiraea* sp.), *Sibiraea*
laevigata, *жимолость* (*Lonicera* n. sp., *L. hispida*), *сунакъ* (*Lycium chinense*);
рѣже обыкновенная *рябина* (*Sorbus aucuparia*, var.) и *смородина* (*Ribes*
Meyeri, *R. pulchellum*); на оголенныхъ склонахъ тѣхъ же боковыхъ ска-
товъ, мѣстами, встрѣчается *дырисунъ* (*Lasiagrostis splendens*). Берега са-
мой Бага-горги, свободные отъ валуновъ, поросли высокою *лозою* (*Salix*
sp.), *облепихою* (*Hippophaë rhamnoides*) и, въ меньшемъ количествѣ,
тополями (*Populus Przewalskii*, n. sp.). Облепиха иногда достигаетъ
здѣсь 40 футовъ вышины и до 1 фута въ діаметрѣ ствола; тополи же
встрѣчаются до 70 фут. вышиною при 2 футахъ толщины. Въ ущельяхъ
правыхъ притоковъ той же Бага-горги появляется тѣнь-шаньская *ель*
(*Abies Schrenkiana*), которая вверхъ отъ 11,000 футовъ мѣшается съ *мож-
жевеловымъ деревомъ* (*Juniperus Pseudo Sabina*) и становится преобла-
дающимъ видомъ. Впрочемъ, какъ ель, такъ и можжевельникъ ра-
стутъ лишь на боковыхъ, нерѣдко чрезвычайно крутыхъ, скатахъ уще-
лій: ель на сѣверныхъ склонахъ, можжевеловое дерево на склонахъ
южныхъ.

Въ этихъ кустарныхъ и лѣсныхъ заросляхъ, на столько запрятан-
ныхъ въ ущельяхъ, что сверху ихъ видно не иначе, какъ подойдя къ
самому обрыву плато, водятся: *ушастые фазаны* (*Crossoptilon auritum*),
изрѣдка фазаны обыкновенные (*Phasianus Strauchi*), *си-фаньскія куро-
патки* (*Perdix sifanica*), *дятлы* (*Picus mandarinus*), *голубыя сороки* (*Pica*
cyanea), *коршуны* (*Milvus melanotis*), *дрозды* (*Merula Kessleri*), *верти-
шейки* (*Junx torquilla*), *горихвостки* (*Ruticilla Hodgsoni*, *R. nigrogularis*),
синицы (*Parus minor*, *Poecille affinis*), *стрепчатки* (*Emberiza cia*), *пѣ-
ночки* (*Reguloides superciliosus*, *Abornis affinis*), *завирушки* (*Accentor*
multistriatus), *Carpodacus Davidianus*, *Carpodacus dubius*, *Certhia fa-
miliaris* и прелестная, вновь здѣсь открытая, *Leptopoeile elegans*; по
оголеннымъ обрывамъ держатся *кеклики* (*Caccabis magna*) и гнѣздятся
грифы, въ особенности *Gyps himalayensis*. Рядомъ съ этими послѣд-
ними, въ тѣхъ же обрывахъ, живутъ *куку-яманы*, а въ лѣсахъ и ку-