

гроза разрѣшилась ничѣмъ; тангуты на насъ не нападали, а мы продолжали попрежнему заниматься своимъ дѣломъ. Впослѣдствіи наши отношенія къ мѣстному населенію сдѣлались болѣе мягкими и хотя мы не вступали съ туземцами въ особую дружбу, но и не враждовали открыто. Тѣмъ не менѣе, во все время пребыванія среди хара-тангутовъ верхней Хуань-хэ мы держали себя весьма осторожно, твердо памятуя, что подобная осторожность служила лучшимъ залогомъ нашей безопасности.

•
Малозамѣтный
прилетъ птицъ.

Въ глубокомъ ущельѣ Бага-горги теперь опять стало тепло, иногда даже жарко, какъ и возлѣ Балекунь-Гоми; многія гнѣздящіяся птицы уже заняли свои мѣста. Изъ пролетныхъ болѣе другихъ замѣтны были: *горихвостки* (*Ruticilla Hodgsoni*, *R. nigrogularis*) и *Carpodacus Davidianus*, а во второй половинѣ апрѣля—*горныя щеврицы* (*Anthus rosaceus*) и *Fringillauda nemoricola*. Но вообще пролетъ птицъ на верхней Хуань-хэ, въ теченіе всего апрѣля, какъ и ранѣе того, въ послѣдней трети марта, былъ весьма бѣдный, при томъ малозамѣтный. Причины этому, вѣроятно, заключаются въ томъ, что изъ видовъ, гнѣздящихся на сѣверѣ въ нашей Сибири, лишь немногіе направляются туда прямымъ меридіанальнымъ путемъ черезъ Тибетское нагорье и Куку-норъ. Тѣ же птицы, которыя гнѣздятся какъ въ горахъ верхней Хуань-хэ, такъ и въ восточномъ Нань-шанѣ, гдѣ встрѣчаютъ сѣверную границу своего распространенія, вѣроятно частію зимуютъ въ глубокихъ ущельяхъ верховій Желтой рѣки, или въ ближайшихъ къ югу мѣстностяхъ. Мы сами нашли въ Южно-куку-норскихъ горахъ зимующими, правда не въ обиліи: *Urocynchramus Pylzowi* и *Accentor rubeculoides*, а въ горахъ возлѣ пикета Шала-хото—*Merula Kessleri*, *Carpodacus Davidianus* и *Carpodacus rubicilloides*. Весною эти близко зимующіе виды или прямо приступаютъ къ гнѣзденію на мѣстахъ своей зимовки, или, подвигаясь лишь недалеко къ сѣверу, являются сюда почти незамѣтно.

Ушастый
фазанъ.

Въ продолженіи восьми сутокъ, проведенныхъ на Бага-горги, мы усердно охотились за птицами для своей коллекціи, но всего болѣе преслѣдовали ушастыхъ фазановъ. Эта великолѣпная птица, извѣстная тангутамъ подъ названіемъ *шярама* и впервые описанная знаменитымъ Палласомъ, подъ именемъ *Crossoptilon auritum*, ростомъ бываетъ въ обыкновеннаго пѣтуха, но кажется болѣе крупною вслѣдствіе своего длиннаго, широкаго хвоста и рыхлаго оперенія. Послѣднее все однообразнаго голубовато-сѣраго цвѣта; бока головы покрыты ярко-красною бородавчатою голою кожею; клювъ желтовато-роговой. Подбо-