

падаютъ также вездѣ по горамъ; есть *зайцы*, *лисицы* и *волки*, но сурковъ (*Arctomys*) мы не встрѣчали. Среди птицъ больше разнообразія. Въ лѣсахъ много *ушастыхъ фазановъ* (*Crossoptilon auritum*); но другихъ куриныхъ, свойственныхъ восточному Нань-шаню (*Ithaginis Geoffroyi*, *Tetrastes Sewerzowi*, *Tetraophasis obscurus*) здѣсь нѣтъ. Изъ мелкихъ пѣвучихъ въ тѣхъ же лѣсахъ обыкновенны: *дроздъ Кесслера* (*Merula Kessleri*), *водная горихвостка* (*Chaemarrhornis leucocerphala*), *тѣнчики* (*Phylloperneuste xanthodryas*, *Abrornis affinis*), *синицы* (*Poecile affinis*, *Lophophanes Beivani?*), *Carpodacus dubius*, *Trochalopteron Ellioti* и др. Въ кустарникахъ альпійской области часто слышится трещаніе *Dumeticola affinis*; кромѣ того попадаются: *красногорлый соловей* (*Calliope Tschebaiewi*), *горная щеврица* (*Anthus rosaceus*), *снигиревидная стренатка* (*Urocynchramus Pylzowi*), а по лугамъ тамъ же поетъ нашъ *полевой жаворонокъ* (*Alauda arvensis*).

Въ самомъ верхнемъ поясѣ альпійской области въ дикихъ скалахъ и розсыпяхъ, между которыми разбросаны жалкія лужайки, слышится прекрасное пѣніе *нипальской завирушки* (*Accentor nipalensis*) и *Pyrrhospiza longirostris*; здѣсь же встрѣчается великолѣпный *голубой чекканъ* (*Grandala coelicolor*) и, въ теченіе круглаго года, живутъ *уллары* (*Megaloperdix thibetanus*).

Наше пребываніе въ этихъ горахъ.

Пройдя отъ г. Гуй-дуй верстъ 40 вверхъ по р. Муджикъ-хэ, на нижнемъ теченіи которой почти сплошь расположены пашни и фанзы осѣдлыхъ хара-тангутовъ рода дунь-цзу, мы достигли лѣсныхъ горъ Муджикъ. Изъ этихъ горъ китайцы и тангуты сплавляютъ въ Гуй-дуй лѣсъ, внизъ по той же Муджикъ-хэ, весьма быстрой и мелкой. Бревна пускаются въ рѣчку по одиночкѣ и хотя онѣ безпрестанно застрѣваютъ въ камняхъ, но рабочіе, идущіе пѣшкомъ по берегу, вновь ихъ освобождаютъ и, такимъ образомъ, съ большою потерей времени и труда, доставляютъ къ мѣсту назначенія. Помимо Гуй-дуй, лѣсъ этотъ отправляется и далѣе внизъ по Хуань-хэ.

Мѣстность, въ которой теперь мы разбили свой бивуакъ, была гораздо доступнѣе, нежели по ту сторону Хуань-хэ. Вновь цвѣтущихъ растеній нашлось довольно много; но изъ птицъ, противъ прежнихъ, прибавились только три вида: *Trochalopteron Ellioti*, *Lophophanes Beivani?* *Dumeticola affinis*; послѣдняя впрочемъ встрѣчалась лишь въ кустарникахъ альпійской области. Ушастыхъ фазановъ было довольно, но теперь они начинали линять и не годились для чучель; при томъ, въ коллекцію уже достаточно набралось этихъ птицъ.

Еще большее разнообразіе растительности нашлось съ переходомъ нашимъ въ альпійскую область горъ Джахаръ. Здѣсь мы расположи-