

престанно валялись мертвыми возлѣ своихъ норъ; многія залились въ тѣхъ же норахъ. Вездѣ по степи летали коршуны, вѣроны и орланы, собирая легкую добычу. Вѣроятно подобныя исторіи случаются нерѣдко, какъ здѣсь, такъ и во всемъ сѣв. Тибетѣ, чѣмъ до извѣстной степени, пріостанавливается необычайное размноженіе плодливаго звѣрька.

Устье р. Ара-голь пересыпано, должно быть недавно, пескомъ, такъ что нынѣ рѣка эта не впадаетъ въ Куку-норъ, но образуетъ недалеко отъ его берега три небольшихъ прѣсноводныхъ озера. Возлѣ сѣвернаго изъ этихъ озеръ мы разбили свой бивуакъ. Мѣсто для стоянки здѣсь было хорошее и мы пробыли на немъ четверо сутокъ, т. е. всѣ послѣдніе дни іюня, занимались рыбною ловлею, охотою и собираніемъ довольно скудной степной флоры. При ясной погодѣ купались въ Куку-норѣ, берегъ котораго отстоялъ отъ нашего бивуака лишь на одну версту. Купанье было превосходное: вода имѣла отъ 18—20° тепла; дно же, при небольшой глубинѣ, состояло изъ мелкаго песка, сбитаго волнами въ твердую массу, словно асфальтъ.

Стоянка на
берегу Куку-
нора.

На озерахъ, образуемыхъ р. Ара-голь, въ большомъ количествѣ держались со своими молодыми *турпаны* и *горные гуси* (*Anser indicus*); кромѣ того здѣсь встрѣчалось много *гагаръ* (*Podiceps cristatus*), которыя еще высиживали яйца на своихъ пловучихъ, изъ травы сдѣланныхъ, гнѣздахъ. Найдена была также большая рѣдкость, именно яйца *черношейнаго журавля* (*Grus nigricollis*), впервые открытаго мною на томъ же Куку-норѣ въ 1873 году. Нынѣшнею весною мы добыли въ свою коллекцію шесть экземпляровъ этихъ рѣдкихъ журавлей и нашли два ихъ гнѣзда. Вообще на Куку-норѣ, сколько можно было теперь видѣть, не только прилетныя, но и мѣстныя птицы большею частію гнѣздятся поздно, вѣроятно вслѣдствіе продолжительныхъ весеннихъ холодовъ. Кромѣ того, не смотря на обиліе воды и болотъ, многія пролетныя голенастыя и водяныя вовсе не остаются здѣсь для вывода молодыхъ ¹⁾.

Не смотря на высокое положеніе мѣстности и на дождливую, весьма прохладную погоду, лѣтомъ на болотахъ Куку-нора множество мошекъ и комаровъ ²⁾, которые въ тихіе дни изрядно донимали какъ

¹⁾ Какъ напр. *крошитель* (*Numenius major*), *сукалень* (*Limosa melanuroides*) *бекасъ* (*Scolopax gallinago*), *шилоклювка* (*Recurvirostra avocetta*), *чибесъ* (*Vanellus cristatus*), *стрѣ* и *малые журавли* (*Grus cinerea*, *G. virgo*), *сырый гусь* (*Anser cinereus*) и даже *утки* (*Anas boschas*, *A. cyreata*, *A. penelope*, *Tadorna cornuta*).

²⁾ Противуположно прежнимъ рассказамъ монголовъ, увѣрявшихъ насъ, при первомъ здѣсь путешествіи, что лѣтомъ на Куку-норѣ нѣтъ вовсе этихъ насѣкомыхъ. Впрочемъ Муркрофтъ встрѣтилъ ихъ въ обиліи даже на гораздо большей абс. высотѣ (15,250 ф.) на оз. Мансороаръ въ юго-западномъ Тибетѣ.