

никъ (*Sisymbrium* n. sp.); рѣже — *Calimeris altaica*, *Anaphalis lactea* n. sp., *Hypochaeris leptocarpum*, *Ephedra monosperma*; послѣдняя впрочемъ чаще встрѣчается на пескѣ по берегу самаго озера. На старыхъ стойбищныхъ мѣстахъ густо растеть *мелкая лебеда* (*Chenopodium Botrys*) и весьма изобильны *шампиньоны* (*Agaricus* sp.). Въ сыпучихъ пескахъ восточнаго берега произрастають: *кустарный чернобыльникъ* (*Artemisia campestris*), розовый *астрagalъ* (*Astragalus* sp.), *ломоносъ* (*Clematis orientalis*, var.), *Hymenolaena* n. sp., бѣлый *василистникъ* (*Thalictrum petaloideum*), колючій низкій кустарникъ *Oxytropis aciphylla*; *нерѣдки* — *ель* (*Abies Schrenkiana*) и *тополь* (*Populus Przewalskii* n. sp.), тотъ же, что на Желтой рѣкѣ, но только здѣсь являющійся маленькимъ деревцомъ, или чаще даже кустомъ. По Бухайнъ-голу обильно *бала-мото* (*Muricaria* sp.); но его нѣтъ по другимъ притокамъ Куку-нора.

Большее разнообразіе флоры встрѣчается на мѣстахъ болотистыхъ, часто покрытыхъ здѣсь маленькими кочками, какъ въ Тибетѣ. Но въ этихъ болотахъ преобладають: обыкновенная *осока* (*Carex* sp.) и *осока тибетская* (*Kobresia thibetica* n. sp.); весьма *нерѣдки* — *лютикъ* (*Ranunculus* sp.), *подорожникъ* (*Plantago* sp.) и *Polygonum Laxmanni*; красиво пестрятъ сплошной зеленый фонъ своими цвѣтами: *бѣлый касатикъ* (*Jris ensata*), розовый *первоцвѣтъ* (*Primula sibirica*), малиновый *Orchis salina*, желтый и бѣлый *мытники* (*Pedicularis chinensis* n. sp., *P. cheilantifolia*); на болѣе же топкихъ мѣстахъ по озеркамъ растуть: водяная *сосенка* (*Hippuris vulgaris*), водяной *лютикъ* (*Ranunculus aquaticus*) и *пузырчатка* (*Utricularia vulgaris*).

Кромѣ того, на Куку-норѣ, какъ и во всей тангутской странѣ, Джумѣ. растеть *джумѣ* (*Potentilla anserina*), небольшое травянистое растеніе, принадлежащее къ семейству Розоцвѣтныхъ. Трава эта весьма обыкновенна также въ Европѣ и извѣстна у насъ подъ названіями гусиной лапки, бедренца, столістника и др. Въ тангутской странѣ, т. е. въ сѣверо-восточномъ Тибетѣ, джумѣ встрѣчается всего чаще на старыхъ покинутыхъ стойбищахъ и по лужайкамъ въ горныхъ лѣсахъ; не чуждается также открытыхъ безлѣсныхъ горъ, растеть тамъ въ долинахъ, гдѣ побольше влаги и почва перегнойная; въ открытыхъ сухихъ стенахъ джумы нѣтъ.

Описываемое растеніе доставляетъ маленькіе удлиненной формы съѣдобные клубни, которыхъ при одномъ корнѣ обыкновенно бываетъ нѣсколько. Вкусомъ своимъ эти клубни въ сыромъ видѣ отчасти напоминають свѣжіе орѣхи; сваренные же весьма походятъ на фасоль или молодой картофель и, будучи приправлены масломъ съ солью, состав-