

ляютъ весьма питательную, вкусную пищу. Копаютъ джуму раннею весною и осенью, т. е. въ то время, когда жизнедѣятельность растенія приостановлена. Этою копотливою работою занимаются тангутскія женщины; добытые клубни моютъ и просушиваютъ на солнцѣ.

У всѣхъ тангутовъ джума составляетъ любимую ѣду и служить лакомствомъ. Ею же питаются слѣпыши (*Siphneus*), весьма обильные въ здѣшнихъ мѣстахъ, и ушастые фазаны. Первые добываютъ клубни описываемаго растенія подъ землею, послѣднія выкапываютъ ихъ своими сильными ногами. Мы сами всегда старались добыть джумы отъ тангутовъ и обыкновенно ѣли ее съ большимъ удовольствіемъ.

Бивуакъ на
устѣ р. Ба-
лема.

Рѣка Балема, называемая монголами *Харынъ-голъ*, при устѣ которой расположенъ теперь нашъ бивуакъ, составляетъ, послѣ Бухайнъ-гола, самый большой притокъ оз. Куку-нора. Она вытекаетъ изъ ближайшихъ частей восточнаго Нанъ-шаня, имѣетъ въ низовьѣ отъ 15—20 сажень ширины и при малой водѣ вездѣ проходима въ бродъ. Лѣтомъ же, въ періодъ дождей, вода въ описываемой рѣкѣ сильно прибываетъ и дѣлается чрезвычайно мутною отъ размываемой лёссовой глины. Эта муть образуетъ въ Куку-норѣ при устѣ Балема большую (версты 4—5 въ діаметрѣ) круглую площадь, которая своимъ желтоватымъ цвѣтомъ рѣзко отличается отъ темногубой воды самаго озера.

Въ рѣкѣ Балема при ея устѣ много рыбы — *Schizopygopsis Przewalskii*, ради чего здѣсь держится множество орлановъ (*Haliaëtus Macei*), чаекъ (*Lagus ichthyaëtus*) и баклановъ (*Phalacrocorax carbo*). По окрестнымъ болотамъ, какъ и на другихъ болотахъ Куку-нора, очень много гнѣздится куликовъ-красноножекъ (*Totanus calidris*) и горныхъ гусей (*Anser indicus*). О послѣднихъ поведемъ теперь рѣчь.

Охота за гор-
ными гусями.

Этотъ красивый гусь, впервые добытый въ Индіи и потому названный знаменитымъ Латамомъ «индѣйскимъ» (*Anser indicus*)¹⁾, гораздо правильнѣе могъ бы получить названіе «гуся горнаго», такъ какъ водится исключительно въ горахъ и на высокихъ плоскогорьяхъ Центральной Азіи. Здѣсь онъ распространяется отъ Индіи до Сибири и заходитъ по Тянь-шаню въ нашъ Туркестанъ; въ Собственномъ Китаѣ не встрѣчается.

Вездѣ описываемый видъ гнѣздится исключительно по горнымъ болотамъ и рѣчкамъ, или по озерамъ на высокихъ плато, какъ, напр., на

¹⁾ Тотъ же видъ позднѣе названъ г. Сѣверцовымъ *Anser Skorniakowii*.