

растутъ лишь на южномъ склонѣ. Въ горахъ же верхней Хуань-хэ всѣ лѣса запряваны въ глубокія, болѣе теплыя ущелья, а сами горы расположены въ близкомъ сосѣдствѣ высокыхъ степныхъ плато, ради чего, помимо болѣе южнаго положенія, снѣговая линія поднимается здѣсь болѣе вверхъ, чѣмъ въ восточномъ Нань-шанѣ.

Области альпійскихъ кустарниковъ Южно-тэтунгскихъ горъ принадлежитъ 12 кустарныхъ видовъ¹⁾, которые, за исключеніемъ лишь двухъ (*Potentilla fruticosa*, *Caragana jubata*), растутъ исключительно на сѣв. склонѣ описываемаго хребта, да и здѣсь занимаютъ главнымъ образомъ скаты, обращенные къ сѣверу. Изъ этихъ кустарниковъ на первомъ мѣстѣ должны быть поставлены *рододендры* четырехъ видовъ (*Rhododendron capitatum*, *Rh. anthopogonoides*, *Rh. thymifolium*, *Rh. Przewalskii*), все новыхъ, привезенныхъ мною еще изъ перваго здѣсь путешествія; затѣмъ слѣдуютъ: *альпійская карагана* (*Caragana jubata*), желтый и бѣлый *курульскій чай* (*Potentilla fruticosa*, *P. glabra*), *тавола* (*Spiraea altaica*), низкая *лоза* (*Salix* sp.) и *Sibiraea laevigata*; на открытыхъ площадкахъ обыкновенна *малина* (*Rubus Idaeus?*), весьма схожая съ нашею, только ростомъ 1—1½ фута; по берегамъ же рѣчекъ растутъ еще болѣе низенькая альпійская *облепиха* (*Hippophaë* sp.) съ крупными (въ горошину) ягодами.

Растительность альпійскаго пояса.

Кромѣ этихъ кустарниковъ, спеціально принадлежащихъ альпійской области, сюда заходятъ изъ лѣсовъ: бѣлый *шиповникъ* (*Rosa sericea*), *барбарисъ* (*Berberis dasystachya* n. sp.), деревомъ растущая *облепиха* (*Hippophaë rhamnoides*) и *древовидный можжевельникъ* (*Juniperus Pseudo-Sabina*); послѣдній поднимается вверхъ до 12,000 фут. абс. высоты. Почва кустарныхъ зарослей, обыкновенно весьма густыхъ, почти вездѣ выстлана *мхомъ* (*Hypnum*).

Изъ травъ между альпійскими кустарниками красуются въ іюль²⁾: *генціаны* (*Gentiana barbata*, *G. Olivieri* var., *G. straminea* n. sp.), *мытники* (*Pedicularis labellata*, *P. Przewalskii* n. sp.), *герань* (*Geranium Pylzowi* n. sp.), крупная *альпійская астра* (*Aster alpinus*), крупный *мыкеръ* (*Polygonum viviparum*), *колокольчикъ* (*Adenophora* sp.), *звѣробой* (*Hypericum Przewalskii* n. sp.), *мелисса* (*Draccephalum tanguticum* n. sp.), *бузульникъ* (*Senecio Sagitta* n. sp.), *живокость* (*Delphinium Pylzowi* n. sp.), *Saussurea pygmaea* n. sp., *Saussurea phaeantha* n. sp., *Saussurea*

¹⁾ Въ Сѣверно-тэтунгскихъ горахъ растительность, какъ лѣсная, такъ и альпійская, та же самая, но въ общемъ не столь обильная.

²⁾ Нижепоименованные виды могутъ быть приняты характерными для лѣтней флоры не только Южно-тэтунгскихъ горъ, но и всего восточнаго Нань-шаня (горъ Гань-су).