

nigrescens n. sp. Тамъ же по небольшимъ лугамъ возлѣ ключей и рѣчекъ цвѣтутъ: *тминъ* (*Carum* sp.), *орошки* (*Oxytropis* sp., *O. ochrocephala* n. sp., *O. kansuensis* n. sp., *O. strobilacea*), *лютикъ* (*Ranunculus affinis*), маленькая *гентіана* (*Gentiana aristata* n. sp., *G. aperta* n. sp.), *Anaphalis alata* n. sp., *Umbilicus* sp., *Bupleurum multinerve*, *Swertia marginata*, etc. Вообще луга альпійскихъ кустарниковъ роскошны своею травянистою флорою, въ особенности въ срединѣ лѣта.

Въ области альпійскихъ травъ кустарные породы исчезаютъ; растутъ однѣ лишь травы, обыкновенно мелкія, невзрачныя. Преобладающихъ, хотя бы на небольшихъ площадкахъ, видовъ нѣть—все перемѣшано, пестрота. Характерными здѣсь растеніями являются: *лукъ синій* и *желтый* (*Allium cyaneum* n. sp. *A. chrysanthum* n. sp.), *гималайская буровица* (*Trollius pumilus*) и *гималайская скерда* (*Crepis glomerata*), *мыжеръ* (*Polygonum viviparum*), *камнеломка* (*Saxifraga* n. sp., *S. hirculus*), три вида *прикрыта* (*Aconitum gymnanthrum* n. sp., *A. Anthora* n. sp., *A. rotundifolium*), *гентіана* (*Gentiana Przewalskii* n. sp.), *ясколка* (*Cerastium melanandrum* n. sp.), *голубой макъ* (*Meconopsis racemosa* n. sp.) уже отцвѣтшій, *вероника* (*Veronica* sp.), *хохлатки* (*Corydalis linarioides* n. sp., *C. trachycarpa* n. sp., *C. dasyptera* n. sp.), *астрагалъ* (*Astragalus scythropus* n. sp.), *Cremanthodium plantagineum* n. sp., *Cremantodium discoideum* n. sp., *Saussurea stella* n. sp., гималайская *Saussurea hieracifolia*, *Нутаенолаена* sp., *Omphalodes blepharolepis* n. sp. и два-три вида мелкихъ злаковъ. По скаламъ, опять-таки всего чаще на ихъ сѣверныхъ склонахъ, растутъ: *очитокъ* (*Sedum* n. sp.), *сухоребрица* (*Draba* sp.) и *Isopyrum grandiflorum*, въ половинѣ іюля уже отцвѣтшій.

Въ самомъ верхнемъ поясѣ альпійскихъ луговъ, тамъ, гдѣ они перемѣшиваются съ розсыпями, встрѣчаются: *Saussurea medusa* n. sp., *Cremanthodium humile* n. sp., *Arenaria kansuensis* n. sp., *Corydalis melanochlora* n. sp., и невзрачный, стелящій по землѣ свои листья, *ревень*, (*Rheum spiciforme*) съ длиннымъ (3—4 фута) и вѣтвистымъ, но тонкимъ нелекарственнымъ корнемъ.

Флора лѣсной области.

Лѣсная область въ горахъ Южно-тэтунгскихъ занимаетъ сѣверный склонъ хребта отъ самой долины р. Тэтунга, т. е. отъ 8,000 фут. abs. поднятія вверхъ до 10 или $10\frac{1}{2}$ тысячъ футовъ. Впрочемъ, густые лѣса оканчиваются футовъ на 500—700 ниже этого предѣла и только можжевеловое дерево восходитъ до границы кустарной растительности. Къ западу отъ устья р. Рангхта, т. е. вверхъ по р. Тэтунгу, лѣса идутъ приблизительно верстъ на 70—80, или, быть можетъ, на 100; далѣе