

отъ 1—2 футовъ; растеть въ изобилии, исключительно на южныхъ скатахъ горъ, въ поясѣ отъ 9—12 тысячъ фут. абс. высоты. *Тополь* (*Populus suaveolens*), распространенный отъ Алтая до Камчатки и Японіи, встрѣчается изрѣдка по дну ущелий въ нижнемъ лѣсномъ поясѣ; ростомъ бываетъ отъ 50—60 футовъ при 2 футахъ толщины. *Рябина красная* (*Sorbus aucuparia* var.) представляетъ, какъ и на верхней Хуанъ-хэ, крупноцвѣтную разновидность; достигаетъ 15 футовъ вышины. *Рябина гималайская* (*Sorbus microphylla*) съ бѣлыми, аллебастрового цвѣта ягодами; достигаетъ такихъ же размѣровъ, какъ и видъ предъидущій. Оба они обыкновенны во всемъ лѣсномъ поясѣ. *Облепиха* (*Hippophae rhamnoides*), то деревцомъ, отъ 15—20 фут. вышиною, то кустарникомъ, сплошь растеть на островахъ рѣчекъ, внизъ отъ 9,000 футовъ абс. высоты. Наконецъ, *Ива* (*Salix* sp.) трехъ видовъ растеть тамъ же, гдѣ и облепиха; изрѣдка встрѣчается по горнымъ склонамъ.

Кустарники описываемыхъ лѣсовъ еще болѣе разнообразны и всего роскошнѣе развиваются въ ущельяхъ по берегамъ горныхъ рѣчекъ. Вотъ перечень этихъ кустарниковъ:

*Барбарисъ* трехъ видовъ (*Berberis chinensis*, *B. diaphana* n. sp., *B. dasystachya* n. sp.), изъ которыхъ два послѣдніе достигаютъ двухсаженной вышины и усажены колючками въ  $1\frac{1}{2}$  дюйма длиною; два вида *смородины* (*Ribes pulchellum*, *R. Meyeri*); *кружевникъ* (*Ribes stenocarpa* n. sp.) въ сажень вышиною, съ крупными, но кислыми желтоватыми ягодами, встрѣчается только въ нижнемъ лѣсномъ поясѣ; два вида *шиповника*, съ бѣлыми и красными цвѣтами (*Rosa sericea*, *R. Przewalskiana*); двухсаженный *жасминъ* (*Philadelphus coronarius*), дико растущій отъ Гималаи до Японіи; семь видовъ *жимолости* (*Lonicera coerulea* var. *tangutica*, *L. hispida*, *L. chrysantha* var. *longipes*, *L. microphylla* var. *Sieversiana*, *L. nervosa* n. sp., *L. tangutica* n. sp., *L. syringantha* n. sp.), изъ которыхъ первый доставляетъ съѣдобныя, попарно сидящія, продолговатыя синія ягоды; три вида *бересклета* (*Evonymus sachalinensis*, *E. nana*, *E. Przewalskii* n. sp.); два вида *кизилника* (*Cotoneaster nigra*? *C. rotundifolia*), *боярка* (*Crataegus* n. sp.), *даурская калина* (*Viburnum dauricum*), *крушина* (*Rhamnus virgata*), *гималайская бузина* (*Sambucus adnata*), *малина* (*Rubus pungens*?), *тавола* (*Spiraea longigemmis* n. sp.), отлично пахучая *Daphne tangutica* n. sp.; два вида *караганы* (*Caragana frutescens*, *C. chamlagu*), *лоза* (*Salix* sp.); *Eleutherococcus senticosus* свойственный лѣсамъ Амура; *Hydrangea pubescens*, *бѣлолозникъ* (*Eurotia ceratoides*), *Potentilla fruticosa* var. и *Caryopteris tangutica* n. sp. Такимъ