

образомъ на небольшомъ сравнительно пространствѣ растутъ 13 видовъ деревьевъ и 36 видовъ кустарниковъ. Если же сюда приложить еще 12 кустарныхъ видовъ, свойственныхъ альпійской области, то мы получимъ всего 61 видъ деревьевъ и кустарниковъ, произрастающихъ въ восточномъ Нанъ-шанѣ.

Травянистая флора тѣхъ же лѣсовъ весьма богата и разнообразна. Наиболѣе характерными ея представителями въ срединѣ лѣта являются: *земляника* (*Fragaria elatior*), теперь поспѣвшая, но съ водянистыми ягодами; *недоспѣлка* (*Cacalia Bobrowskii* n. sp.), *бузульники* (*Senecio tanguticus* n. sp., *S. Virgaurea* n. sp., *S. Przewalskii* n. sp.), *лекарственный ревень* (*Rheum palmatum*) довольно рѣдкій, *водосборъ* (*Aquilegia esalcarata* n. sp.), *живокость* (*Delphinium grandiflorum*), *прикрыты* (*Aconitum Lycostonum*, рѣже *A. volubile*), *колокольчики* (*Adenophora*) четырехъ видовъ, *герань* (*Geranium arvense*), *грушевка* (*Pyrola rotundifolia*), *горошекъ* (*Vicia unijuga*), *майникъ* (*Maianthemum bifolium*), *кровохлебка* (*Sanguisorba officinalis*), *мытники* (*Pedicularis lasiophrys* n. sp., *P. rudis* n. sp., *P. muscicola* n. sp.), изъ которыхъ послѣдній красиво выстилаетъ мшистую почву, въ особенности хвойныхъ лѣсовъ, своими розовыми цвѣтами; рядомъ съ нимъ, въ тѣхъ же хвойныхъ лѣсахъ, мѣстами прокидываются маленькія *орхидеи* (*Gymnadenia cucullata*, *Peristylus viridis*, *Goodyera repens*). Далѣе слѣдуютъ—*вонючка* (*Cimicifuga foetida*), *василистникъ* (*Thalictrum* sp.), *очитокъ* (*Sedum Aizoon*), *нижма* (*Tanacetum* sp.), *китайская ромашка* (*Pyrethrum sinense*), *Doronicum stenoglossum* n. sp., *Podophyllum Emodi*, *Aralia* sp., *Hymaenolaena* n. sp., *Anaphalis margaritacea*, *Triosteum pinnatifidum* n. sp., *Codonopsis viridiflora* n. sp., *синюха* (*Polemonium coeruleum*), *репейникъ* (*Agrimonia pilosa*), *кипрей* или *Иванъ чай* (*Epilobium angustifolium*) мѣстами сплошь по луговымъ площадкамъ верхняго лѣснаго пояса; *лактукъ* (*Lactuca* sp.), *бальзамина* (*Impatiens politantere*), *тминъ* (*Carum* sp.), тотъ же, что и въ альпійской области; *гималайскій звѣробой* (*Halenia elliptica*), *джумá* (*Potentilla anserina*), *крапива* (*Urtica dioica* var.), *бѣлый касатикъ* (*Iris ensata*) нерѣдко сплошь по долинамъ нижняго лѣснаго пояса; *хвощъ* (*Equisetum arvense*), нѣсколько видовъ *злаковъ* (*Poa serotina*, *Avena* sp., *Bromus* sp.), вьющіяся *ломоносы* (*Clematis orientalis*, *C. aethusaefolia*), *живучка* (*Ajuga* sp.), *саранка* (*Lilium tenuifolium*), *злѣгоголовникъ* (*Dracoscephalum altaense* var.); три послѣдніе вида встрѣчаются преимущественно по открытымъ горнымъ склонамъ. Лѣсную почву часто выстилаютъ *мхи*: въ лиственныхъ лѣсахъ—*Нурнит* sp., въ хвойныхъ—*Мниит* sp.; тѣ и другіе нерѣдко лѣпятся по скаламъ. Въ тѣхъ же горныхъ лѣсахъ мы нашли 11 видовъ *папоротниковъ*. Изъ нихъ