

Aspidium filix mas, *Nephrodium sp.*, *Cystopteris montana*? принадлежатъ листовеннымъ лѣсамъ; *Aspidium aculeatum*, *Polypodium Dryopteris*— лѣсамъ хвойнымъ. Кромѣ того въ тѣхъ и другихъ, подъ скалами и на самыхъ скалахъ, растутъ папоротники: *Cystopteris fragilis*, *Adiantum pedatum*, *Adiantum Roborowskii n. sp.*, *Polypodium n. sp.*, *Asplenium sp.*, *Cheilanthes argentea*. Наконецъ въ лѣсахъ восточнаго Нань-шаня обыкновенны грибы, при томъ тѣ же самыя, которые растутъ и у насъ: боровики, березовики, подосиновики (эти три вида рѣдки), сыропѣжки, рыжики, волнушки, масляники, шампиньоны и другіе несъѣдобныя, которыхъ назвать не умѣю. Мѣстные тангуты, какъ и всѣ ихъ собратья, вовсе не употребляютъ грибовъ въ пищу; изрѣдка, и то неохотно, ѣдятъ ягоды.

Фауна тѣхъ же горъ.

Не смотря на обиліе лѣсовъ въ восточномъ Нань-шанѣ, здѣсь вообще мало млекопитающихъ, какъ по числу видовъ, такъ и по количеству экземпляровъ. Тому причинами служатъ для крупныхъ звѣрей довольно густое населеніе описываемыхъ горъ, а для мелкихъ, хотя бы грызуновъ, вѣроятно, слишкомъ сырой климатъ во время лѣта. Малое же количество этихъ грызуновъ обуславливаетъ, въ свою очередь, и бѣдность мелкихъ хищниковъ, которые ими питаются. Правда, теперь мы пробыли въ восточномъ Нань-шанѣ слишкомъ короткое, при томъ самое плохое, время для изслѣдованія млекопитающихъ; за то лѣтомъ и осенью 1872 г. и весной 1873 г. достаточно обшарили эти самыя горы. Но какъ тогда, такъ и теперь нашли здѣсь всего лишь 18 дикихъ видовъ млекопитающихъ¹⁾, принадлежащихъ къ тремъ отрядамъ: хищныхъ, грызуновъ и жвачныхъ. Изъ нихъ альпійской области свойственны: куку-яманъ (*Pseudois Nahoer*), сурокъ (*Arctomys sp.*), два вида тушухи (*Lagomys thibetanus?*, *Lagomys sp.*) и полевка (*Arvicola sp.*). Въ лѣсахъ живутъ: медвѣдь (*Ursus sp.*) весьма рѣдкій, маралъ (*Cervus sp.*), косуля (*Cervus pygargus*), кабарга (*Moschus moschiferus?*), волкъ (*Canis lupus*)²⁾, лисица (*Canis vulpes*), барсукъ (*Meles sp.*) и хорекъ (*Mustela sp.*); изрѣдка попадаются дикая кошка (*Felis sp.*) и летяга (*Pteromys sp.*); по открытымъ долинамъ и луговымъ горнымъ скатамъ весьма обыкновенны слѣпыши (*Siphneus sp.*); здѣсь же встрѣчаются въ небольшомъ числѣ и зайцы (*Lepus sp.*).

¹⁾ Или 22 вида, если приложить три вида—*Antelope gutturosa*, *Canis corsac*, *Spermophilus sp.*, найденные въ степной полосѣ къ сѣверу отъ р. Чагрынь-голь, и рысь (*Felis lynx?*), которая, какъ говорятъ, водится въ лѣсахъ Тэтунскихъ горъ.

²⁾ Кромѣ того туземцы сообщали намъ о другомъ какомъ то волкѣ; быть можетъ то тибетскій *Canis chanko*.