

(*Gypaëtus barbatus*), *уларъ* (*Megaloperdix thibetanus*), *бѣлоспинный голубь* (*Columba leuconota*), *альпійская клушица* (*Pyrrhocorax alpinus*), *голубой чекканъ*, (*Grandala coelicolor*), *вьюрки* (*Pyrrhospiza longirostris*, *Fringilla lauda nemoricola*), *непальская завирушка* (*Accentor nipalensis*), *горный стрыжь* (*Cypselus pacificus*), *кашмирская ласточка* (*Chelidon kashmiriensis*).

Въ области альпійскихъ луговъ и кустарниковъ: *си-фаньская куропатка* (*Perdix sifanica*), *горная щеврица* (*Anthus rosaceus*), *красногорный соловей* (*Calliope Tschebaiewi*), *Carpodacus rubicilloides*, *Dumeticola affinis*; по рѣчкамъ — *кашмирская оляпка* (*Cinclus kashmiriensis*) и *водная горихвостка* (*Chaemarrhornis leucoserphala*). Два послѣдніе вида проходятъ также черезъ всю лѣсную область.

Въ лѣсномъ поясѣ: *ушастый фазанъ* (*Crossoptilon auritum*), *фазанъ обыкновенный* (*Phasianus Strauchi*), *рябчикъ* (*Tetrastes Sewerzowi*), *кундыкъ* (*Tetraophasis obscurus*), *сермунъ* (*Ithaginis Geoffroyi*), *дрозды* (*Merula Kessleri*, *M. Gouldii*, *Turdus auritus*), *горихвостки* (*Ruticilla Hodgsoni*, *R. frontalis*, *R. nigrogularis*), *пѣночки* (*Phyllopneuste plumbeitarsa*, *Ph. xanthodryas*, *Abrornis affinis*), *дятель* (*Picus mandarinus*), *кукушка* (*Cuculus canorinus*), *гималайскій свиристель* (*Pyrrhula erythacus*), *Carpodacus Davidianus*, *Carpodacus dubius*, *Pterorhinus Davidi*, *Trochalopteron Elliotti*. Въ хвойныхъ лѣсахъ прибавляются: *поползень* (*Sitta villosa*), *пищуха-сверчокъ* (*Certhia familiaris*), *корольки* (*Troglodytes fumigatus*, *Regulus himalayensis*), *хохлатая синица* (*Lophophanes dichroides*), *сойка* (*Garrulus Brandtii*), *дубоносъ* (*Mycerobas carnipes*); въ болѣе широкихъ долинахъ поетъ *полевой жаворонокъ* (*Alauda arvensis*) и громко кричитъ *большая щеврица* (*Corydalla Richardii*). Изъ водяныхъ птицъ гнѣздится лишь одинъ *горный гусь* (*Anser indicus*), да и то въ мѣстностяхъ ближайшихъ къ оз. Куку-нору; изъ голенастныхъ — *горный куликъ* (*Ibidorhyncha Struthersii*), и быть можетъ, изрѣдка *спрая цапля* (*Ardea cinerea*, var. *brag.*).

Изъ гадовъ въ восточномъ Нанъ-шанѣ водятся лишь 2 вида змѣй (*Elaphis dione*, *Trigonocephalus intermedius*) и наша обыкновенная *лягушка* (*Rana temporaria*). Рыбъ нами найдено 6 видовъ: *Schizopygopsis Stoliczkaei*, *Schizopygopsis Pylzowi*, *Squaliobarbus curriculus*, *Diptychus n. sp.*, *Nemachilus robustus*, *Diplophysa sp.?* Царство насѣкомыхъ, хотя не обильно, но, сколько кажется, и небѣдно, въ особенности въ самомъ нижнемъ горномъ поясѣ.

Мѣстные
тангуты.

Населеніе Сѣверно и Южно-тэтунгскихъ горъ составляютъ тангуты, въ меньшемъ количествѣ китайцы. Послѣдніе, съ небольшимъ