

причины, которыя приковываютъ растительную жизнь къ той или другой мѣстности пустыни. Изъ другихъ характерныхъ кустарниковъ для этой послѣдней можно поименовать: *Reaumuria songarica*, *Zygophyllum xanthoxylon*, *Calligonum mongolicum*, *Atraphaxis compacta*, *Atraphaxis lanceolata*, *Convolvulus tragacanthoides*, *Caragana Bungei*, *Caragana sp.*, *Artemisia campestris*, *Tragopyrum sp.*, etc. Изъ травъ, кромѣ уже названныхъ сульхира и дырисуна, наиболѣе характерными служатъ: различныя солянки — *Kalidium*, *Kochia*, *Salicornia*, *Salsola*, *Halogeton*, *Suaeda*, *Agriophyllum*, лукъ (*Allium*), полынь (*Artemisia*), *Zygophyllum mucronatum n. sp.*, *Peganum Harmala*, *Psamma villosa* (на пескахъ), *Tribulus terrestris*, *Sophora alopecuroides*, *Marrubium lanatum*, *Glaux maritima*, *Arnebia*, *Adonis*, *Statice*, виды злаковъ, сложноцвѣтныхъ, и др. При томъ во многихъ мѣстахъ почва пустыни абсолютно бесплодна и иногда на десятки верстъ совершенно оголена.

Относительно своей фауны Гоби представляетъ отдѣльную зоологическую область, но въ общемъ не можетъ похвалиться богатствомъ животнаго царства. Правда, въ нѣкоторыхъ здѣсь мѣстностяхъ—въ степныхъ полосахъ, въ горахъ, по рѣкамъ и озерамъ—животныя скопляются нерѣдко въ обилии, но въ самой пустынѣ онѣ встрѣчаются сравнительно рѣдко; здѣсь только множество ящерицъ, безпрестанно снующихъ подъ ногами путника. При томъ не только нѣкоторыя птицы, но даже звѣри Гоби ведутъ кочевую жизнь въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ большаго или меньшаго достатка корма. Относительно этого послѣдняго, животныя пустыни вообще весьма неприхотливы и еще болѣе воздержны относительно питья; нѣкоторыя изъ мелкихъ млекопитающихъ (*Meriones*, *Lagomys*), вѣроятно, не пьютъ во всю свою жизнь, довольствуясь сочными солянковыми растеніями, или свѣжею травою въ степяхъ, а зимою изрѣдка выпадающимъ снѣгомъ.

Всего въ собственной Гоби съ Ордосомъ и Ала-шанемъ нами найдено какъ въ настоящее, такъ и въ прежнія здѣсь путешествія, 46 видовъ дикихъ млекопитающихъ; ¹⁾ въ Чжунгаріи съ долиною р. Урунгу—21 видъ; на Лобъ-норѣ съ нижнимъ Таримомъ—20 видовъ ²⁾, Изъ нихъ исключительно Чжунгаріи свойственны отъ 8—10 видовъ, а Лобъ-нору съ Таримомъ отъ 8—12 видовъ. Слѣдовательно во всей Гоби най-

¹⁾ Если же выбросить горы (Ала-шаньскія, Муни-ула, Хара-наринъ-ула и Хурху) да степныя окраины Гоби, то число видовъ млекопитающихъ собственно для пустыни уменьшится болѣе, чѣмъ на половину.

²⁾ Въ моемъ отчетѣ «Отъ Кульджи за Тянь-шань и на Лобъ-норѣ», стр. 30, поименовано лишь 16 видовъ; къ нимъ слѣдуетъ прибавить летучую мышь и три вида грызуновъ.