

какъ западная половина той же Гоби, въ особенности Таримская и Чжунгарская пустыни, тщательно избѣгаются пролетными птицами.

Среди осѣдлыхъ пернатыхъ, наиболѣе характерными для Гоби можно назвать: *больдурука* (*Syrrhaptes paradoxus*), *ворона* (*Corvus corax*) и *мохноногого сыча* (*Athene plumipes*), распространенныхъ повсемѣстно; *саксаульную сойку* (*Podoces Hendersoni*), другой видъ которой—*Podoces Biddulphi* обитаетъ лишь въ Таримской пустынѣ; *саксаульного воробья* двухъ видовъ (*Passer ammodendri*, *Passer timidus* n. sp.), первый найденъ лишь въ Чжунгаріи, послѣдній всюду, гдѣ растетъ саксауль; *ушастаго жаворонка* (*Otocoris albigula*), котораго нѣтъ лишь на Таримѣ; *пустынного вьюрка* (*Erythrospiza mongolica*), избѣгающаго луговыхъ степей; *земляного вьюрка* (*Pyrgilauda Davidiana*), наоборотъ свойственнаго лишь степной полосѣ; *монгольскаго жаворонка* (*Melanocorypha mongolica*) и маленькаго *жавороночка* (*Alaudula chelœensis*), обитающихъ также въ степныхъ частяхъ Гоби.

Изъ прилетающихъ гнѣздиться птицъ пустынѣ свойственны: *коршунъ* (*Milvus melanotis*), *удодъ* (*Upupa epops*), *чекканы* (*Saxicola atrogularis*, *S. isabellina*); послѣдній видъ впрочемъ лишь въ степяхъ; *сорокопуты* (*Lanius ageranius*, *L. phoenicurus*), изрѣдка малые *журавли* (*Grus virgo*), а по солянымъ озерамъ—*утка нырялка* (*Tadorna cornuta*) и *турпаны* (*Casarca rutila*).

Изъ класса пресмыкающихся Гоби, какъ было упомято выше, обильна ящерицами, которыхъ здѣсь извѣстно до сихъ поръ 25 видовъ, принадлежащихъ почти исключительно двумъ родамъ: *Phrynoscephalus* и *Podarces* (подъ-рода *Eremias*). Мѣстами эти ящерицы чрезвычайно многочисленны; наибольшее ихъ разнообразіе встрѣчается въ Ала-шанѣ и вообще въ южной Гоби. Змѣи въ пустынѣ довольно рѣдки. Нами найдено всего 8 видовъ¹⁾, изъ которыхъ болѣе обыкновенны *Zamenis spinalis* и *Trigonosephalus intermedius*. *Черепухи* (*Trionyx sinensis*) водятся лишь на Хуань-хэ въ Ордосѣ. Здѣсь встрѣчаются также, мѣстами въ большомъ количествѣ, обыкновенная и зеленая лягушки (*Rana temporaria*, *Rana esculenta*), ненайденныя въ другихъ частяхъ Гоби²⁾. За то жабы попадаются нерѣдко по ключевымъ болотцамъ пустыни: въ западной ея части *Bufo viridis*, а въ восточной *Bufo Raddei*³⁾.

¹⁾ Съ долинами Хуань-хэ и нижняго Тарима.

²⁾ Но вѣроятно онѣ водятся въ сѣверной и восточной степныхъ окраинахъ Гоби. Обыкновенная лягушка (*Rana temporaria*), кромѣ Ордоса, найдена была нами въ Гань-су, на Куку-норь и на верхней Хуань-хэ; зеленая же (*Rana esculenta*) только въ Ордосѣ.

³⁾ Восточнѣе Хами и нижняго Тарима *Bufo viridis* не найдена; въ остальной Гоби встрѣчается лишь восточно-азиатская жаба—*Bufo Raddei*, добытая нами также на Куку-норь и на верхней Хуань-хэ.