

Сульхирь даетъ не только прекрасный кормъ монгольскому скоту, но своими мелкими, какъ макъ, сѣменами доставляетъ важный продуктъ питанія ала-шаньскимъ монголамъ. Вопреки поговоркѣ: «не посѣешь не пожнешь» — ала-шаньцы, въ особенности въ болѣе дождливое лѣто, собираютъ въ концѣ сентября обильную жатву на своихъ пескахъ. Затѣмъ тутъ же, на готовыхъ токовищахъ, каковыми служатъ всѣ оголенные мѣста лёссовой подпочвы, обмалачиваютъ собранный сульхирь. Сѣмена его сначала поджариваютъ, а потомъ мелютъ ручными жерновами и получаютъ вкусную муку, которою питаются въ теченіе круглаго года. Кромѣ того сульхирь служитъ во время зимы главною пищею безчисленныхъ стадъ большуруковъ, прилетающихъ въ Ала-шань на зимовку изъ болѣе сѣверныхъ частей Гоби; тѣми же сѣменами, вѣроятно, питаются и зерноядныя пташки при осеннемъ перелетѣ черезъ пустыню.

*Pugionium.* Другое замѣчательное, хотя далеко не столь полезное для туземцевъ растеніе песковъ Ала-шаня—это *Pugionium*,—называемое монголами *дзермикъ-лобынъ*, т. е. «дикая рѣдька». Дѣйствительно, его сырые плоды имѣютъ рѣдечный или горчичный вкусъ и запахъ; китайцы же собираютъ молодые первогодные экземпляры самаго растенія, солятъ ихъ и ѣдятъ какъ овощъ. *Pugionium* до послѣдняго времени составляло большую рѣдкость, такъ какъ извѣстно было лишь по двумъ вѣточкамъ, добытымъ въ прошломъ вѣкѣ естествоиспытателемъ Гмелиномъ, вѣроятно отъ богомольцевъ, возвратившихся изъ Тибета въ сѣв. Монголію. Въ 1871 году мнѣ удалось впервые встрѣтить и собрать описываемое растеніе въ Ордосѣ. Въ числѣ привезенныхъ тогда нами экземпляровъ нашлось два вида; изъ нихъ одинъ опредѣленъ былъ академикомъ К. И. Максимовичемъ, какъ уже извѣстный черезъ Гмелина—*Pugionium cornutum*, а другой—какъ новый, названный г. Максимовичемъ *Pugionium dolabratum*. Различаются они, главнымъ образомъ, формою своего плода, который у перваго вида весьма походить на двойной кинжалъ, а у послѣдняго обрубленъ, или какъ бы огрызень на заостренномъ концѣ; кромѣ того, есть различія въ формѣ листьевъ и цвѣтка. Оба растенія, сколько кажется, двулѣтнія; онѣ принадлежатъ къ семейству крестоцвѣтныхъ и формою своею отчасти напоминаютъ кустарникъ. Стволъ имѣютъ не болѣе фута въ длину, да и тотъ обыкновенно почти весь запрятанъ въ сыпучемъ пескѣ. Съ вершины такого ствола, на второй годъ жизни растенія, отростаетъ густая, шарообразная или, чаще, овальная куча тонкихъ и ломкихъ, но густыхъ и сильно переплетающихся между собою вѣточекъ, на концахъ которыхъ развиваются невзрачныя бѣлыя или