

ками долины Хуань-хэ ¹⁾. Нынѣ, по сообщенію ала-шаньскихъ монголовъ, изъ этого скота уцѣлѣли лишь нѣсколько экземпляровъ; остальные переловлены и перебиты мѣстными жителями.

Неожиданный
пролетъ птицъ.

Вопреки ожиданію, мы встрѣтили теперь въ Ала-шанѣ, да и далѣе встрѣчали по пути серединою Гоби, довольно сильный пролетъ птицъ. Напрямикъ черезъ пустыню летѣли изъ Сибири не только сильныя птицы, напр. лебеди, гуси, журавли, но даже и слабыя птички, каковы: *погоньши* (*Ortygometra Bailloni*), *мухоловки* (*Erythrostera albicilla*, *Hemichelidon sibirica*), *варакушки* (*Cyanecula coerulecula*), *камышевки* (*Locustella certhiola*), *стренатки* (*Emberiza pusilla*, *Synchramus schoeniclus*), *корольки* (*Reguloides superciliosus*), *горихвостки* (*Ruticilla aurea*), *Netura cyanura* и др.; совсѣмъ плохо летающія *мысухи* (*Fulica atra*) и *водяной пастушекъ* (*Rallus aquaticus*) встрѣчены были также на пролетѣ въ пустынѣ ²⁾.

Въ общемъ валовой пролетъ происходилъ съ 10 августа по 20 сентября; далѣе летѣли лишь отсталые, или случайно запоздавшіе экземпляры. Въ августѣ пролетныхъ птицъ, преимущественно мелкихъ пташекъ, считалось 37 видовъ; въ сентябрѣ, когда всего болѣе летѣли водяныя, въ пролетѣ насчитывалось, кромѣ прежнихъ, 48 видовъ; наконецъ одинъ видъ (*Viscerhala clangula*) замѣченъ былъ въ началѣ октября. Такимъ образомъ на осеннемъ пролетѣ черезъ пустыню наблюдалось теперь нами 86 видовъ птицъ, притомъ многія въ большомъ количествѣ экземпляровъ. Такое наблюдение показываетъ, что пернатые, по крайней мѣрѣ осенью, не слишкомъ то облетаютъ восточную половину Гоби и слѣдуютъ изъ Восточной Сибири напрямикъ въ Китай. Между тѣмъ, лежащая западнѣе Ала-шаня пустыня Хамійская и Лобъ-норская, гораздо больше избѣгаются пролетными птицами ³⁾, разъ по причинѣ своей крайней дикости и безплодія, а главное потому, что вслѣдъ за ними тотчасъ же лежитъ высокое и пустынное нагорье сѣв. Тибета; тогда какъ, перелетѣвъ черезъ восточную Гоби, птицы сразу попадаютъ въ теплый, плодородный Китай и уже безъ труда слѣдуютъ далѣе на югъ, или остаются зимовать. Весною, когда въ Гоби еще стоятъ сильныя холода, а корму и воды гораздо меньше, нежели осенью, тѣ же пролетныя птицы, возвращаясь въ Сибирь, стараются пересѣчь пустыню

¹⁾ «Монголія и страна Тангутовъ». Т. I, стр. 145 и 146.

²⁾ Водяной пастушекъ встрѣченъ былъ лишь однажды на ключѣ Чиргу-булыкѣ близъ Галбынъ-гоби.

³⁾ Осенью 1879 г. наблюдалось нами въ Цайдамѣ и сѣв. Тибетѣ пролетныхъ птицъ: въ августѣ 28 видовъ; въ сентябрѣ 10; въ октябрѣ 1. Всего за осень—39 видовъ.