

ausgeschlossen, dass die neue Art ein Vertreter einer besonderen Gruppe innerhalb der Sektion *Phaca* ist, die durch die verhältnismässig kurzen, ziemlich tief gespaltenen und stark weissbehaarten Kelche ausgezeichnet wäre. Solange jedoch Früchte noch nicht bekannt sind, lässt sich die engere Verwandtschaft der neuen Art nicht mit Sicherheit angeben«. (Dr. E. ULBRICH'S note).

*Astragalus Hedinii* Ulbrich, in Engl. Bot. Jahrb. 35 (1905) 680. (Pl. V, Fig. 3).

Suffrutex ramosus caulibus erectis striatis, foliis ad 25 cm. longis, 10—11-jugis; foliola glaberrima vel rarius sparsissime hirtula, 1—1,5 mm. longe petiolulata, rotundato-ovata, apice obtusa vel leviter emarginata; lamina ad 22 mm. longa, 16 mm. lata. Stipulae persistentes ad  $\pm$  10 mm. longae, triangulari-ovatae, glaberrimae, acutae, inter se liberae. Pedunculi folia multo superantes ex axillis superioribus ad 40 cm longi, glaberrimi vel apice rarissime pilis solitariis nigris albisque intermixtis vestiti. Flores in racemum laxiorem dispositi, ad 5 mm. pedicellati, patuli, ad 28 mm. longi; bractea lineari-lanceolata, 5—6 mm. longae membranaceae, caducae; calyx glaber vel pilis nigris albisque perparce puberulus, ad 13 mm. longus, dentibus nigris superioribus e basi triangulari-linearibus  $\pm$  2 mm. longis, inferioribus linearibus ad 4 mm. longis. Corolla roseo-violacea vel albescens; vexillum recurvum  $\pm$  26 mm. longum  $\pm$  13 mm. latum, apice incisum vel crenatum, media in parte striatum; alae vexillo paulo longiores ad  $\pm$  5 mm. latae, lanceolatae, unguiculo 10 mm. longo; carina subtus angulo recto curvata  $\pm$  25 mm. longa, latissima in parte 7 mm. lata, apice angustata, basi cum ungue  $\pm$  12 mm. longa,  $\pm$  2 mm. lata. Fructuum racemus valde elongatus; legumen pendulum, paulo falcatum, inflatum, ad 5 cm. longum, 1 cm. latum, glaberrimum, apice attenuatum vel acuminatum, basi in stipitem ad 15 mm. longum tenuem attenuatum.

Northern *Tibet*, Mandarlik, 3437 m., medio July 1900 (flow. and with young fruits).

»Die Art gehört zur Sektion *Pogonophace*, § 3, *Coluteocarpus* Boiss. und ist mit *Astragalus coluteocarpus* Boiss. aus Afghanistan nahe verwandt, unterscheidet sich jedoch durch viel kräftigeren Wuchs, grössere, 10- bis 11-jochige Blätter, fast vollständige Kahlheit in allen ihren Teilen, grössere Blüten und Früchte.

»In meiner ersten Beschreibung der Art in Engler's Botan. Jahrb. 35, H. 5, p. 679, konnte ich keine genauere Fundortsangabe machen, da bei dem mir damals vorliegenden Materiale nur provisorische Zettel lagen, aus denen sich hierüber nichts feststellen liess. Diese Zettel trugen die Jahreszahl 1903. Auf den endgültigen Zetteln sind die obigen Standortsangaben verzeichnet.« (Dr. ULBRICH'S note).

*Astragalus* sp.

Eastern *Pamir*, Upper Basik-kul, Kara-jilga, 3727 m., 24th July 1894 (flowering).

*Astragalus* sp.

Northern *Tibet*, Yapkaklik, Chimen-tagh, 3998 m., 22nd July 1900 (flowering).

Dr. E. ULBRICH writes: *A. verosimiliter novus, sed nimis incompletus.*