

Tarbagatai aut Ala-tau« gesammelte Pflanzen im Herb. Al. de BUNGE und ein von KRASSNOW (Flora Iliensis 1886) bei Chargos gesammeltes Stück.

»Ich halte daher *A. kirghisorum* Schrenk nicht für identisch mit *A. camelorum* Fischer, sondern für eine eigene Art, deren Verbreitung sich westlich wahrscheinlich nicht über Turkestan hinaus erstreckt.«

*Geogr. ara:* Southern Kirghise steppe from Tarbagatai to the middle Thian-shan (A. Regel, Karelin and Kiriloff no. 1425, Krassnow), eastwards to Songaria (Schrenk, nos. 284, 483 and 598).

### Fam. Rosaceæ

(determ. by C. H. OSTENFELD).

*Potentilla.* About 10 years ago one of the best authorities on the genus the late Dr. TH. WOLF of Dresden was so kind to revise my naming of the material of this genus. In the following I have added his remarks to the identifications. His valuable monograph of the genus is quoted throughout.

A few of the plants which have come into my hands later, have not been seen by Dr. Wolf.

*Potentilla fruticosa* L., Sp. pl. ed. 1 (1753) 495; Th. Wolf, Monogr. Gatt. *Potentilla*, in Bibl. Bot. XVI (1908) 55; Hemsley and Pearson, in Peterm. Mitteil., Ergänzungsbd. 28 (1900) 373; Hemsley, in Journ. Linn. Soc. 35 (1902) 175; Stewart, in Bull. Torrey Bot. Club (1916) 635 (var. *ochreatea*, *Inglisii* and *pumila*); Fedtschenko, in Acta Horti Petrop. XXVIII (1907) 110, (1909) 483 (var. *pumila*); *P. floribunda* Pursh; Fedtschenko, l. c. XXI (1903) 329; XXIV (1905) 329.

Of this variable species the following forms have been collected by Dr. S. HEDIN:<sup>1</sup>

1. var. *vulgaris* Willd. f. *arbuscula* (Don) Th. Wolf.

Northern *Tibet*, Mandarlik, 3437 m., medio July 1900 (locality not quite sure); sterile.

2. var. *parvifolia* (Fisch.) Th. Wolf, l. c. 58; *P. fruticosa*, var. *ochreatea* Hook. f., Fl. Brit. Ind., vix Lehm.; Keissler, in Ann. Naturh. Hofmuseum (1907) 25.

Northern *Tibet*, Mandarlik, 3437 m., medio July 1900 (flow.).

Note by Dr. TH. WOLF: »Die var. *ochreatea* bei LEHMANN ist keine besondere Varietät, sondern eine nichtssagende Form verschiedener Varietäten; bei HOOKER fil. ist sie = *P. parvifolia* Fisch. in Lehm., sowohl nach der Beschreibung als auch nach einem Original exemplar Hookers. In der Beschreibung fehlt nur: foliis plurimis trijugis, jugis duobus inferioribus verticillatim approximatis; solche ‚folia trijuga‘ sind aber tatsächlich an seinem Original vorhanden! (wie auch bei vorliegenden Pflanzen).«

<sup>1</sup> Besides the records given here HEMSLEY and PEARSON (l. c.) record *P. fruticosa* from N. E. Tibet, Camp XXXI, 4616 m., 21st Sept. 1896.