

haarung der Ährchenachse (die fast die Deckspelzenlänge erreicht) und gewöhnlich höher inserierte Granne.«

*Geogr. area:* Northern and Central Europe, Russia, Caucasus, Siberia, N. America; (of var. *purpurascens*): Arctic Asia, Greenland, Arctic America.

***Calamagrostis Hedinii* Pilger, nov. spec.**

Culmus (unicus mihi visus) erectus, 60 cm. fere altus, 4-nodis, glaber lævis, internodia quam vaginæ longiora, panicula longius exserta; foliorum innovatorum (ut videtur intravaginalium, in specimine haud cum culmo cohærentium) lamina glauca, rigida, erecta, anguste linearis, arcte involuta, intus et margine valde scabra, pungentia acuta, ad 20 cm. longa, ligula membranacea, apice denticulata, ad 3 mm. longa, vagina firma, bene striata, glauca vel albescens; foliorum culmeorum lamina brevior, suprema 7 cm. longa, vagina suprema 13 cm. longa, ligula in foliis culmeis ad 5 mm. longa; panicula 9 cm. longa, densa, ambitu ovato-lanceolata, rami scabri, a basi divisi et spiculigeri, inferiores ad 4 cm. longi; spiculæ angustæ; glumæ vacuæ anguste lanceolatæ, longe angustatæ, inferior  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  superioris æquans, nervis lateralibus 2 brevibus instructa, superior 6 mm. longa, 1-nervia; pilorum corona bene evoluta, spiculam æquans; gluma florifera tenuissima 3 mm. longa, elliptica, apice denticulata, 3-nervia, ex apice tenuiter aristata, arista 1—2 mm. tantum longa; palea dimidiam glumam æquans, ovalis, brunneata, denticulata.

Northern *Tibet*, Kash-otak, Lat.  $38^{\circ} 3'$ , Long.  $90^{\circ} 47'$ , 2916 m., 3—20th Aug. (flowering).

Dr. R. PILGER writes: »Die neue ausgezeichnete Art kann mit *C. emodensis* Griseb. verglichen werden, bei der aber u. a. die zweispaltige Deckspelze verhältnismäßig kürzer und länger begrannt ist und die Vorspelze länger ist; *C. Stolizkai* Hook., von der ich nur die kurze Beschreibung kenne, hat nach dieser kürzere Achsenhaare und eine längere Vorspelze; die Hüllspelzen sind ungefähr gleichlang.«

***Ælropus litoralis* (Gouan) Parl., Fl. Ital. I (1848) 461; Ledeb., Fl. Ross. IV (1853) 369.**

East-Turkestan, Yust-chapghan, Lop-nor, 817 m., 24th June 1900 (flowering).

*Geogr. area:* Mediterranean, Western Asia and eastwards to Turkestan and Songaria; China (var. *sinensis*).

***Phragmites vulgaris* (Lam.) Crép., Man. Fl. Belg. ed. 2 (1866) 345; *Ph. communis* Trin.; Hemsley, in Journ. Linn. Soc. 35 (1902) 203; Hemsley and Pearson, in Peterm. Mitteil., Ergänzungsbd. 28 (1900) 375; Stewart, in Bull. Torrey Bot. Club 43 (1916) 627; *Arundo phragmites* L.; Fedtschenko, in Acta Horti Petrop. XXI (1903) 443, XXIV (1904) 149, (1905) 350.**

East-Turkestan, Usun-köl, a lake near Abdal, Lop-nor, 817 m., 23rd June 1900 (sterile); Southern Tsaidam, 2731 m., 17th Oct. 1896.