

B. Pennatæ.**II. Fragilarioideæ.****2. Tabellarieæ.****a) Tabellariinæ.**Gatt. **Tabellaria** E.

9. *T. fenestrata* (Lyngb.) Kg. A. S. Atl. T. 269, F. 11—13. D. T. Syll. Bac. p. 743.
Pamir: Gletscherbach am Westhang des Mus-tagh-ata, sehr selten.
10. *T. flocculosa* (Roth) Kg. A. S. Atl. T. 269, F. 14—19. D. T. Syll. Bac. p. 744.
Weiter verbreitet und häufiger als vorige.
Pamir: In Gletscherbächen am Mus-tagh-ata; östlich vom Bassik-kul; Tschakker-agil; Lagune am Kleinen Kara-kul; Quellen östlich vom Jeschil-kul; Quelle bei Bulun-kul.
Tibet: Zwischen Lager XXVII und XXVIII (1900); östlich vom Tso-ngombo, mehr als 4000 m hoch.

3. Meridioneæ.Gatt. **Meridion** Ag.

11. *M. circulare* (Grev.) Ag. A. S. Atl. T. 267, F. 34—49. D. T. Syll. Bac. p. 642.
Sehr selten in einer Quelle am Nordufer des Panggong-tso (Lager 146, 1901), Tibet.

4. Fragilarieæ.**a) Diatominæ.**Gatt. **Diatoma** D. C.

12. *D. elongatum* Ag. A. S. Atl. T. 268, F. 37—39. D. T. Syll. Bac. p. 636.
Tibet: Mapiék-köll, an *Utricularia*; Westufer des Selling-tso (Lager 76, 1901).
var. tenuis (Ag.). A. S., l. c., F. 41—46. D. T., l. c.
Häufiger als die Art.
Tibet: Abdall, an *Myriophyllum* (häufig!); Mapiék-köll, an *Utricularia*; Lager 103, 4860 m hoch; östlich vom Tso-ngombo, mehr als 4000 m hoch.
13. *D. hiemale* (Lyngb.) Heib. A. S. Atl. T. 267, F. 1—6, 12—15. D. T. Syll. Bac. p. 636.
Pamir: Quelle am Südstrand des Kleinen Kara-kul; Tschakker-agil.
Tibet: Östlich vom Tso-ngombo, über 4000 m hoch (massenhaft!); ferner in Probe M (Fundort?).