

32. *Eun. arcus* E. A. S. Atl. T. 274, F. 33—43, 45, 48—55. D. T. Syll. Bac. p. 790.
Pamir: Gletscherbach am Westhang des Mus-tagh-ata, selten.
var. bidens Grun. A. S., l. c., F. 46, 47. D. T., l. c., p. 791.
Tibet: Mapiék-köll, sehr selten an *Utricularia*.

III. Achnanthoideæ.

5. Achnantheæ.

Gatt. *Achnanthes* Bory.

Sect. *Microneis* Cl.

33. *A. minutissima* Kg. V. H. Syn. T. 27, F. 35—38. Cl. N. D. II, p. 188.
Pamir: Umgebung des Kleinen Kara-kul; Quellen östlich vom Jeschil-kul.
Tibet: Quellsee im Kwen-lun-Gebirge; Sorgotsu; Abdall; Kara-koschun; Kumköll; Mapiék-köll (sehr häufig!); östlich vom Tso-ngombo; Nordufer des Panggong-tso.
34. *A. microcephala* Kg. V. H. Syn. T. 27, F. 20—23. Cl. N. D. II, p. 188.
Tibet: Kwen-lun-Gebirge; Mapiék-köll; östlich vom Tso-ngombo; Nordufer des Panggong-tso.
35. *A. linearis* W. Sm. V. H. Syn. T. 27, F. 31, 32. Cl. N. D. II, p. 188.
Tibet: Nordufer des Panggong-tso, Lager 146, 14. 12. 1901.
36. *A. pamirensis* nov. spec. Tab. IX, fig. 10, 11.
Valvis lanceolatis, in media parte inflatis, apicibus obtuse-rotundatis. Valva inferior raphe directa, area axiali angustissima, area centrali transversaliter dilatata, marginem valvæ attingenti. Valva superior eadem, sed area centrali latiore. Striis tenuissimis, radiantibus.
Long. valv. 25 μ .
Lat. valv. 6 μ .
Striæ circiter 32 in 10 μ .
Hab. in fonte ad lacum »Jeschil-kul«, Pamir, rarissime.
37. *A. Hedini* nov. spec. Tab. IX, fig. 12—14.
Valvis lanceolatis, in media parte sæpe leviter inflatis, apicibus late-rotundatis vel subtruncatis. Valva inferior raphe directa, area axiali lanceolata, striis marginalibus brevibus. Valva superior area hyalina latissima, lanceolata, striis marginalibus brevissimis.
Long. valv. 15—25 μ .
Lat. valv. 3—4 μ .
Striæ 23—26 in 10 μ .
Hab. Tibet, inter castra XXVII et XXVIII (1900).