

Sect. *Achnanthidium* (Kg.) Heib.

38. *A. lanceolata* Bréb. V. H. Syn. T. 27, F. 8—11. Cl. N. D. II, p. 191.

Tibet: Östlich vom Tso-ngombo; Nordufer des Panggong-tso.

- var. dubia* Grun. V. H., l. c., F. 12, 13. Cl., l. c., p. 192.

Tibet: Östlich vom Tso-ngombo.

- var. ventricosa* Hust. Bac. Sud. p. 64. T. II, F. 32.

Pamir: Quelle am Südstrand des Kleinen Kara-kul.

39. *A. pinnata* nov. spec. Tab. IX, fig. 15—18.

Valvis late-ellipticis, apicibus rotundatis. Valva inferior raphe directa, area axiali angusta, area centrali nulla. Valva superior pseudoraphe angustissima. Striis radiantibus, validioribus.

Long. valv. 6—9 μ .

Lat. valv. 4—5 μ .

Striae circiter 16 in 10 μ .

Hab. Tibet, prope lacum »Tso-ngombo«, castra CXXXIV (1901).

Diese kleine Form ähnelt bei flüchtiger Beobachtung außerordentlich der *Fragilaria pinnata*, besonders da die Raphe nicht leicht sichtbar ist.

40. *A. coarctata* Bréb. V. H. Syn. T. 26, F. 17—20. Cl. N. D. II, p. 192.

Pamir: Gletscherbach am Westhang des Mus-tagh-ata, sehr selten.

41. *A. brevipes* Ag. V. H. Syn. T. 26, F. 10—12. Cl. N. D. II, p. 193.

Tibet: Häufig im Tossun-nor, Tsaidam.

Gatt. **Rhoicosphenia** Grun.

42. *Rh. curvata* Kg. A. S. Alt. T. 213, F. 1—5. Cl. N. D. II, p. 165.

Pamir: Nur im östlichen Teile gefunden, Tschakker-agil; Quelle bei Bulun-kul.

Tibet: Kuku-nor (häufig!); Kum-köll (sehr häufig!); Mapiek-köll; östlich vom Tso-ngombo, bei Lager 134 (1901, häufig!).

6. Cocconeideæ.Gatt. **Cocconeis** (E.) Cl.

43. *C. pediculus* E. A. S. Atl. T. 192, F. 56, 58—63. Cl. N. D. II, p. 169.

Tibet: Häufig in einer zarten Form im See No. 5 westlich vom Lager XV (südöstlich vom Arka-tag).

44. *C. placentula* E. A. S. Atl. T. 192, F. 38—51. Cl. N. D. II, p. 169.

Pamir: Umgebung des Kleinen Kara-kul (sehr häufig!); Tschakker-agil.