

Tibet: Hier sehr verbreitet und oft massenhaft in einer kleinen Form. Quellsee im Kwen-lun-Gebirge; Nordabhang des Arka-tag, Quelle bei Lager X; See (No. 3?) zwischen Lager XII und XIII [*forma minor*, massenhaft!]; See No. 18, zwischen Lager XXVI und XXVII [ebenso!]; See No. 20, Lager XXXI [ebenso!]; Tossun-nor [ebenso!]; Sorgotsu; Kuku-nor [ebenso!]; Kara-koschun; Abdall [ebenso!]; Tschallpak, Atschik-bulak; Kum-köll (häufig!); Mapiék-köll; Gebiet nördlich vom Selling-tso; Lager 103 (1901); Umgebung des Tso-ngombo; Nordufer des Panggong-tso.

Gatt. **Eucoconeis** Cl.

45. *Eucocc. flexella* (Kg.) Cl. V. H. Syn. T. 26, F. 29—31. Cl. N. D. II, p. 179.
Pamir: Quellen östlich vom Jeschil-kul.
Tibet: Quellgewässer im Kwen-lun-Gebirge (häufig!); Gebirge nördlich vom Selling-tso; östlich vom Tso-ngombo.

IV. Naviculoideæ.

7. Naviculeæ.

a) Naviculinæ.

Gatt. **Gyrosigma** Hass.

46. *G. acuminatum* Kg. Perag. Pleuros. T. VII, F. 36, 37. Cl. N. D. I, p. 114.
Pamir: Tschakker-agil.
Tibet: Sorgotsu (häufig!).
47. *G. attenuatum* Kg. Perag. Pleuros. T. VII, F. 9. Cl. N. D. I, p. 115.
Tibet: Östlich vom Tso-ngombo, Lager 136 (1901).

Gatt. **Pleurosigma** W. Sm.

48. *Pl. elongatum* W. Sm. Perag. Pleuros. T. II, F. 20—21. T. III, F. 5—8. Cl. N. D. I, p. 38.
Tibet: Tossun-nor, Tsaidam, zerstreut.
Die Formen entsprechen der Abbildung Perag. III, F. 8.

Gatt. **Scoliopleura** Grun.

49. *Sc. Peisonis* Grun. A. S. Atl. T. 261, F. 12. Cl. N. D. I, p. 105.
Tibet: Westufer vom Selling-tso, Lager 76, sehr selten!

Bemerkenswerte Form, die bisher nur selten beachtet worden ist. Allgemeine Verbreitung, soweit bekannt: Europa (Neusiedler See), Amerika (Salzsee, Utah), Asien (Selling-tso).