

119. *St. javanica* Grun. Cl. N. D. I, p. 150. A. S. Atl. T. 241, F. 3.
Pamir: Quelle am Südstrand des Kleinen Kara-kul; häufig in den Gletscherbächen am Mus-tagh-ata.

Gatt. **Anomœoneis** Pfitz.

120. *A. exilis* (Kg.) Grun. Cl. N. D. II, p. 8. V. H. Syn. T. 11, 12.
Pamir: Gletscherbach am Westhang des Mus-tagh-ata.
Tibet: Mapiék-köll, an *Utricularia*.
121. *A. sphærophora* Kg. Cl. N. D. II, p. 6. A. S. Atl. T. 49, F. 49—51.
Tibet: Kara-koschun; Mapiék-köll; Westufer vom Selling-tso bei Lager 76.
var. Güntheri O. M. *f. truncata* O. Müll. El Kab, p. 302. T. 12, F. 8, 9.
Pamir: Östlich vom Bassik-kul.

Stimmt in Form und Struktur genau mit Müllers Angaben überein, ist aber viel größer, 65 μ lang, 32 μ breit (nach Müller 26—33 μ : 13—14 μ).

Gatt. **Amphipleura** Kg.

122. *A. pellucida* Kg. Cl. N. D. I, p. 126. V. H. Syn. T. 17, F. 14, 15A.
Tibet: Häufig im Mapiék-köll, an *Utricularia*; ferner bei Abdall, an *Myriophyllum*.
123. *A. rutilans* Trentep. Cl. N. D. I, p. 126. V. H. Syn. T. 16, F. 15—18.
Tibet: Vereinzelt mit voriger bei Abdall; halophil!

Gatt. **Amphiprora** E.

124. *A. paludosa* W. Sm. Cl. N. D. I, p. 14.
Tibet: Mapiék-köll, an *Utricularia*.

Die Exemplare stehen der *var. subsalina* Cl. nahe. Aber die Auftreibung der Verbindungslinie zwischen Kiel und Valva ist noch auffälliger und mehr abgerundet, während Cleve bei *var. subsalina* eine mehr winklige, spitze Auftreibung zeichnet.

- var. duplex* Donk. Cl., l. c., p. 15. V. H. Syn. T. 22, F. 15, 16.
Tibet: Häufig im Tossun-nor, Tsaidam; sehr häufig bei Tschallpak, Atschik-bulak.

Gatt. **Mastogloia** Thw.

125. *M. Smithi* Thw. Cl. N. D. II, p. 152. V. H. Syn. T. 4, F. 13.
Tibet: Kara-koschun; Tschallpak, Atschik-bulak; Kum-köll; sehr häufig im Mapiék-köll. Sehr variabel in Form und Größe.
- var. lacustris* Grun. Cl., l. c. V. H., l. c., F. 14.
Tibet: Unter der Art im Kara-koschun; Mapiék-köll.