

191. *N. frustulum* (Kg.) Grun. D. T. Syll., p. 543. V. H. Syn. T. 68, F. 28, 29.
Pamir: Lagune am Kleinen Kara-kul; Gletscherbach am Mus-tagh-ata.
Tibet: See No. 5; Westufer vom Selling-tso; Nordufer des Panggong-tso
(häufig!).

var. asiatica nov. var. Tab. X, fig. 56.

Differt a typo apicibus obtuse protractis, striis circiter 32 in 10 μ .

Hab. prope lacum »Selling-tso«, Tibet.

Die Pole sind meistens noch stumpfer als in der Figur dargestellt, typischere Formen werde ich in A. Schmidts Diatomeen-Atlas bringen.

192. *N. regula* nov. spec. Tab. X, fig. 57.

Frustulis prismaticis; valvis linearibus, marginibus parallelis, apicibus subrostratis, truncatis; punctis carinalibus minimis, 11—12 in 10 μ , striis transversis delicatis, circiter 30 in 10 μ .

Long. valv. 87 μ .

Lat. valv. 5 μ .

Hab. in aqua gelida montis »Mus-tagh-ata«, Pamir; rarissime.

VII. Surirelloideæ.

11. Surirelleæ.

Gatt. *Cymatopleura* W. Sm.

193. *C. Solea* (Bréb.) W. Sm. A. S. Atl. T. 275, F. 3—7, 11. T. 276, F. 2, 3.
D. T. Syll. Bac., p. 599.

Pamir: Lagune am Oststrand des Kleinen Kara-kul; Tschakker-agil.

Tibet: Sorgotsu (häufig!); Kara-koschun; Westufer vom Selling-tso; östlich vom Tso-ngombo.

var. apiculata (W. Sm.) Ralfs. A. S. Atl., l. c., T. 275, F. 8—10, 12, 13, T. 276, F. 1. D. T., l. c.

Tibet: Sorgotsu, unter der Art.

Gatt. *Surirella* Turp.

194. *S. ovalis* Bréb. A. S. Atl. T. 24, F. 1—5. D. T. Syll. Bac., p. 579.

Tibet: Quellsee im Kwen-lun-Gebirge; Tossun-nor, Tsaidam; Westufer vom Selling-tso.

var. ovata Kg. A. S. Atl. T. 23, F. 49—55. D. T. Syll. Bac., p. 580.

Pamir: Kleiner Kara-kul, Lagune am Oststrand; Gletscherbach am Westhang des Mus-tagh-ata [die Individuen nähern sich der *var. Crumena*].