

calice couvert de grosses glandes mais tout à fait glabre du reste et dont les dents sont linéaires, subulées dès la base et non lancéolées deltoïdes; par ses folioles parsemées de grosses glandes couleur de miel.

20. *O. lutchensis*, sp. nov.

*O. Tillingii* valde affinis, sed breviter caulescens; stipulæ pallidæ, membranaceæ, nec fuscæ, demum coriaceæ; flores paulo minores probabiliter lutescentes, nec purpurascens.

*Hab.* — Le bassin du Loutch, affluent du Kéria daria.

21. *O. Dutreuli*, sp. nov.

(*Mesogæa*). — Ad collum dense multiceps; caules hornotini graciles, 10-15 cent. alti, decumbentes vel ascendentes, setulis adpressis conspersi; stipulæ a petiolo liberæ, breves, setulosæ, hyalinæ, lanceolatæ, acutæ; folia 3-4 cent. longa, breviter petiolata, 6-8 juga, petiolo brevi, foliolis parvis, ovato-lanceolatis, 4-5 mm. longis, setulis arcte adpressis subcinerascentibus vestitis; pedunculi foliis subduplo longiores; flores 12-20 subcapitati vel etiam ineuntes breviter racemosi, 1 cent. longi, purpurascens; bractæ lanceolatæ pedicello longiores, membranaceæ, pilis nigris vestitæ, 3 mm. longæ; calyx 3-4 mm. longus, pube nigra adpressa vestitus, ad medium 5 dentatus, dentibus linearibus; vexillum breviter bilobum; carinæ mucro 1 mm. longus.

*Hab.* — Les environs de Kar Yâgdé, alt. 3,910 mètres, 12 août 1892.

Beaucoup moins velu que l'*O. Kashmiriana* Cambessedes, avec des folioles plus petites et moins aiguës. Port de l'*O. glacialis*, de l'*O. proboscidea*, dont les tiges florifères ne sont pas développées.

22. *O. nivalis*, sp. nov.

(*Protoxytropis*). — Tota cano-villosa; foliola 6-10 juga, vix 4 mm. longa; flores dense capitati vel in racemum breviter ovatum congesti; calicis albo-villosi dentes tubum subæquantes; corolla parva, circiter 6-7 mm. longa, vexillo violaceo, obovato, retuso, carinam paulo superante; carina intense purpureo-violacea, mucrone e basi triangulari porrecto subulato leviter arcuato; legumen maturum 4-5 mm. longum, fere orbiculatum, obtusum vel apice rotundatum.

*Hab.* — Mang-rtsé dans la chaîne de Oustoun tâgh, alt. 5,200 mètres, 6-7 septembre 1892; au delà du col Ko-né-ding, 20 septembre 1892.

Voisin de l'*O. proboscidea* Bunge et de l'*O. glacialis* Benth., il diffère