

лія здѣсь сульхира, мелкія сѣмена котораго служать пищею для названныхъ птицъ. Вообще, по пути черезъ Гоби мы встрѣтили очень мало зимующихъ пернатыхъ, да и то нерѣдко лишь единичными экземплярами. Главная тому причина—безкорница, частію же и сильные холода пустыни.

Урошице Баянъ-булыкъ вкраплено въ юго-западной окраинѣ одной изъ самыхъ обширныхъ песчаныхъ площадей Ала-шаня, называемой мѣстными монголами *Тынгери*. По своей архитектурѣ эти сыпучіе пески представляютъ, какъ и въ другихъ мѣстахъ, безчисленное множество невысокихъ холмовъ и уваловъ, съ выдутыми между ними то воронкообразными, то удлиненными котловинами. Преобладающее направленіе песчаныхъ уваловъ въ Тынгери меридиональное, но много встречается и исключений. Отдельные холмики имѣютъ отъ 50—70, иногда до 100 футовъ вышины, увалы же всегда ниже; тянутся они обыкновенно отъ 15—30 сажень; глубина котловинъ сажень 5—7. Съ навѣтреной стороны покатость песка всегда пологая и самый песокъ сбитъ здѣсь довольно твердо; со стороны же подвѣтреной, въ особенности у холмовъ, песокъ всегда рыхлый и образуетъ крутую осьшь. Иногда по вершинамъ уваловъ тянутся невысокіе острые гребни. Навѣреная поверхность какъ холмовъ, такъ и уваловъ почти всегда испещрена волнистыми, обыкновенно перпендикулярными къ направлению господствующаго вѣтра, линіями, много напоминающими собою легкую зыбь на поверхности тихой воды. На днѣ котловинъ иногда обнажается подпочва, состоящая изъ твердой лѣссовой глины. По котловинамъ же, преимущественно на ихъ западныхъ скатахъ, кое-гдѣ ростутъ плотными кучками—*сулхиръ* (*Agriophyllum gobicum*) и обыкновенный *тростникъ*; рѣже торчить здѣсь деревцо *Hedysarum arbuscula* или кустъ *Myricaria platyphylla*. Все это встречается лишь недалеко въ глубь песчаныхъ залежей. На самыхъ ихъ окраинахъ, гдѣ къ песку болѣе примѣшана лѣссовая глина, растительность пустыни сравнительно обильнѣе. Затѣмъ внутри сплошныхъ песчаныхъ площадей царствуетъ бесплодіе и безводіе. Впрочемъ, по словамъ монголовъ, кое-гдѣ въ пескахъ южнаго Ала-шаня попадаются ключевые урошица, подобныя Баянъ-булыку; изрѣдка соленую воду можно добывать, выкапывая неглубокія ямы въ лѣссовой подпочвѣ.

Тропа отъ Баянъ-булыка черезъ южный рукавъ песковъ Тынгери, всего на протяженіи 14 верстъ, была хорошо проторена. Она вьется здѣсь по уваламъ и скатамъ песчаныхъ холмовъ. Песокъ былъ снизу подмерзши, и наши верблюды шли по немъ легко.