


зеркало на заду бѣлыя. Бока и передъ шеи сѣровато-бурые; волоса спереди шеи удлинены и образуютъ подобіе гривы, какъ у марала и нѣкоторыхъ аргали; при томъ эти волоса болѣе мягки, чѣмъ на другихъ частяхъ тѣла. Морда тупая, какъ у *Ant. gutturosa*, въ общемъ съ окраскою немного болѣе свѣтлою, чѣмъ туловище; переносица изъ-сѣра бурая; почти такого же цвѣта широкія полосы отъ глазъ по щекамъ; впереди и сзади глазъ бѣлыя пятна, Въ передней части щекъ и под-



Антилопа Кювье (*Antilope Cuvieri n. sp.*) <sup>1)</sup>.

бородка волосы удлинены, образуютъ небольшія баки и родъ бороды, какъ у тибетской *A. picticauda*. Подбородокъ и верхняя часть горла, гдѣ

длина туловища . . . . .	24,0 дюйм.	23,5 дюйм.
вышина у загривка . . . . .	25,5 "	25,5 "
" у заднихъ ногъ . . . . .	27,5 "	27,0 "
объемъ туловища посерединѣ . . . . .	28,5 "	28,0 "
хвостъ (безъ волосъ) . . . . .	4,0 "	4,0 "
длина роговъ по изгибу . . . . .	11,0 "	—
разстояніе между верхн. концами роговъ	5,5 "	—

<sup>1)</sup> Самецъ въ зимней шерсти  $\frac{1}{10}$  натур. величины.