

кадыкъ (который замѣтно не выдается), бѣлые. Уши средней величины, спереди бѣлые, сзади свѣтло-песочного цвѣта, какъ и волоса задней части шеи, которые немного удлинены. Слезныхъ ямокъ нѣтъ. У основанія роговъ мало замѣтные удлиненные пучки волосъ. Рога довольно отлого поставлены, мелко-рубчаты и круто заворочены концами внутрь. Ноги свѣтло-песочного цвѣта, снаружи бурыя; копыта маленькия и тонкія, почти чернаго цвѣта. Возлѣ мужскаго органа большая железа. Хвостъ съ боковъ бѣлый, сверху — цвѣта туловища.

Самка отличается лишь малозамѣтнымъ буроватымъ цвѣтомъ спереди шеи, но болѣе явственнымъ, чѣмъ у самца, на переносицѣ, снаружи переднихъ и заднихъ ногъ. Паховой железы у нея нѣтъ.

Въ лѣтней короткой шерсти описываемая антилопа имѣеть красновато-песочную окраску туловища. Бурый цвѣтъ на переносицѣ, спереди шеи (удлиненныхъ волосъ тогда здѣсь нѣтъ) и ногъ мало замѣтенъ.

Антилопа Кювье обитаетъ спорадически въ Центральной Азіи и притомъ въ ограниченныхъ районахъ. Она найдена была нами, кромѣ Чагрынской степи, на озерѣ Куку-норѣ. Кромѣ того, какъ оказывается, тотъ же видъ встрѣченъ былъ нами въ 1871 г. въ Ордосѣ, въ долинѣ сѣвернаго изгиба Желтой рѣки. Подобно другимъ антилопамъ описываемая держится стадами иногда въ 30—50 головъ, иногда же маленькими кучками въ 5—10 экземпляровъ. Живетъ исключительно въ плодородныхъ степяхъ. Не особенно осторожна и убить ее, тѣмъ болѣе на пересѣченной мѣстности, довольно легко. Только звѣрь этотъ, какъ и другіе звѣри Центральной Азіи, весьма выносливъ на рану, въ особенности изъ малокалиберной винтовки Бердана.

Нами замѣчено, что, по количеству антилопъ Кювье, самки далеко преобладаютъ надъ самцами, несмотря на то, что эти послѣдніе гораздо осторожнѣе. Въ стадѣ старые самцы исполняютъ роль вожаковъ и охранителей; при бѣгствѣ всегда следуютъ позади; послѣ же выстрѣловъ обыкновенно бросаются самокъ, вѣроятно, какъ менѣе осторожныхъ, и уходятъ въ стороны.

Вновь открытая антилопа, какъ кажется, можетъ завершить собою списокъ этихъ животныхъ для Центральной Азіи. Новый изъ нихъ видъ едва ли здѣсь еще найдется, развѣ какой-нибудь горный въ южномъ Тибетѣ. Изъ семи же видовъ, обитающихъ во всей Центральной Азіи специально ей свойственны только четыре, а именно: *дзерен* (*A. gutturosa*) въ сѣверной и юго-восточной Монголіи; *антилопа Кювье* (*A. Cuvieri*) въ Ордосѣ, Гань-су и на Куку-норѣ; *оронго* (*A. Hodgsoni*) и *ада* (*A. picticauda*) въ сѣверномъ Тибетѣ; послѣдняя также въ горахъ къ сѣверу