

отъ Куку-нора. Затѣмъ въ той же Центральной Азіи распространяются изъ другихъ областей: *антилопа горная* (*A. caudata*) изъ Собственного Китая; найдена была нами лишь въ горахъ Муни-ула и Сырунь-булыкъ на сѣверномъ изгибѣ Желтой рѣки; *сайга* (*A. saiga*), встрѣчающаяся только въ западной Чжунгаріи, гдѣ находитъ свою восточную границу; наконецъ, *хара-сульта* (*A. subgutturosa*), распространенная отъ Каспійскаго моря до Собственного Китая, обитаетъ по Центральной Азіи: въ Чжунгаріи, въ бассейнѣ Тарима, въ средней и южной Гоби съ Ордосомъ, а также на нагорьѣ Тибета—въ Цайдамѣ и въ урочищѣ Гасъ къ югу отъ Лобъ-нора.

Тотчасъ за рѣкою Чагринъ, въ направленіи нашего пути, т. е. къ западу, высились два громадные параллельные хребта, составляющіе расширенныя вѣтви того же Нанъ-шаня и сопровождающіе по обоимъ берегамъ теченіе другого притока верхней Хуанъ-хэ—р. *Тэтунгъ-голь*, или *Датунъ-хэ*. Оба эти хребта—*Сѣверно-* и *Южно-тэтунгскій*—уже описаны ранѣе мною¹⁾. Здѣсь упомяну только, что они обильно орошены, имѣютъ весьма богатую флору, фауну и значительное населеніе, словомъ, несутъ характеръ, свойственный многимъ другимъ горнымъ хребтамъ верхняго бассейна Желтой рѣки.

Пребываніе въ горахъ Сѣв.-тэтунгскихъ.

Мы вошли въ Сѣверно-тэтунгскій хребетъ ущельемъ р. Ярмынь-голь и провели пять сутокъ въ среднемъ поясѣ горъ, тамъ, гдѣ появляются прекрасныя лѣса, свойственныя этой части Ганъ-су. Мѣсто нашего бивуака было отличное; охоты и экскурсіи по окрестнымъ горамъ ежедневно доставляли много цѣнныхъ экземпляровъ для коллекціи. Впервые отъ самой Урги встрѣтили мы теперь благодатный уголокъ и радовались этому, какъ дѣти. Погода днемъ стояла довольно теплая. Однако всѣ сѣверныя склоны горъ были засыпаны снѣгомъ, въ верхнемъ поясѣ отъ 2—3 футовъ глубиною. Склоны же южныя всюду были безснѣжны, и почва здѣсь на солнечномъ пригрѣвѣ не замерзала. Такое обстоятельство, т. е. безснѣжіе, въ теченіе всей зимы, южныхъ горныхъ склоновъ весьма выгодно какъ для мѣстныхъ звѣрей, такъ и въ особенности для птицъ. Тѣ и другія находятъ достаточно для себя пищи въ суровое время года, да притомъ на солнечномъ пригрѣвѣ, несмотря на ночные морозы, днемъ довольно тепло. Поэтому въ горахъ Ганъ-су встрѣчаются зимою многіе нѣжные виды пернатыхъ (*Ruticilla nigrogularis*, *Accentor rubeculoides*, *A. nipalensis*, *Carpodacus dubius*, *C. Davidianus*, *C. rubi-*

¹⁾ «Монголія и страна тангутовъ», стр. 229—248; подробнѣе и съ исправленіями «Третье путешествіе по Центральной Азіи», стр. 405—420.