

большаго тибетского жаворонка, звонкий свистъ красногихъ куликовъ и хриплый крикъ горныхъ гусей.

На Бухайнъ-голѣ мы провели двое сутокъ по случаю Свѣтлаго праздника. Христосуясь съ казаками, я даль каждому, вмѣсто краснаго яйца, по полуимперіалу. Изъ запасовъ еще московскихъ, до сихъ поръ почти нерасходовавшихся, мы полакомились теперь коньякомъ¹⁾ и кое-какими презервами; подѣлились, конечно, и съ казаками. Словомъ, праздникъ встрѣченъ былъ и проведенъ съ нѣкоторымъ комфортомъ. Послѣ полудня ловили рыбу въ очистившихся отъ льда заливахъ Бухайнъ-гола и поймали болѣе сотни довольно крупныхъ (отъ 1—2 фут.) рыбъ, между которыми, кромѣ ранѣе открытаго мною *Schizopygopsis Przewalskii*, оказались еще два новыхъ вида—*Sch. leptcephalus n. sp.*, *Sch. gracilis n. sp.* Помимо экземпляровъ, положенныхъ въ спиртъ для коллекціи, мы сварили вечеромъ отличную уху. Названная рыба весьма вкусная; только икра ея, какъ и у нѣкоторыхъ другихъ рыбъ, обитающихъ въ водахъ высокихъ нагорій Центральной Азіи, негодится для юды, ибо очень вредно дѣйствуетъ на желудокъ. Мнѣ приходило на мысль—не служить ли такое свойство способомъ сохранить икру отъ истребленія послѣ нереста?

Слѣдующій послѣ праздника день нашей стоянки на Бухайнъ-голѣ посвященъ былъ охотѣ. Но какъ теперь, такъ и до сихъ поръ наши охоты на Куку-норѣ были не особенно добычливы по причинѣ сравнительно малаго количества пролетныхъ птицъ хотя бы водяныхъ. Тоже самое замѣчено было здѣсь нами въ мартѣ 1873 года и въ февралѣ 1880 года. Даже столь обыденныхъ въ весеннюю пору большихъ утиныхъ стай мы не видали на Куку-норѣ ни разу. При томъ для гнѣзденія утки не остаются здѣсь вовсе. Горные же *гуси* (*Anser indicus*), *турпаны* (*Casarca rutila*) и *чайки* (*Larus ichthyaetus*, *L. brunneicephalus*) плодятся въ достаточномъ числѣ, равно какъ и *красногоніе кулики* (*Totanus calidris*) по болотамъ. Кромѣ этихъ птицъ, изъ другихъ пролетныхъ чаще встречаются на самомъ озерѣ *бакланы* (*Phalacrocorax carbo*), а по степямъ *орлы* (*Aquila bifasciata*, *A. clanga?*) и *сарычи* (*Archibuteo aquilinus*, *Buteo sp.*); лѣтомъ для ловли рыбы являются сюда *орланы* (*Haliaetus Macei*).

Къ 1-му апрѣля, т. е. ко дню нынѣшняго нашего прихода на Куку-норѣ, въ прилетѣ здѣсь замѣчено было лишь 18 видовъ перна-

¹⁾ При путешествіи зимою на постоянномъ холдѣ, даже непьющему человѣку, по временамъ хочется выпить чего-нибудь спиртнаго; лѣтомъ такого позыва не бываетъ.