

для караваннаго хожденія. Само ущелье Номохунъ-гола не широко, мѣстами даже узко. Почва здѣсь, равно какъ и по скатамъ окрестныхъ горъ, состоитъ изъ мелкаго наноса и лёссовыхъ отложеній. Ближе къ наружной окраинѣ горы почти совершенно безплодны, но въ средней части хребта, благодаря, вѣроятно, чаще, нежели далѣе къ западу ¹⁾, падающимъ во время лѣта дождямъ, растительность сравнительно лучше; здѣсь по ущелью растутъ *дырисунъ*, горные же скаты нерѣдко покрыты двумя или тремя видами *мелкихъ злаковъ*, иногда образующихъ сносные луга. Только цайдамскіе монголы лишь изрѣдка пасутъ по нимъ свой скотъ, опасаясь разбойниковъ тангутовъ. Кромѣ того, на сѣверныхъ склонахъ ущелий встрѣчаются небольшіе лѣса *можжевельнаго дерева* (*Juniperus Pseudo-Sabina*) и площади кустиковъ *курильскаго чая* (*Potentilla fruticosa*). Въ верхнемъ поясѣ Бурханъ-Будда разстилаются довольно скудные альпійскіе луга, которые на сѣверномъ склонѣ не доходятъ футовъ на 500—600 до перевала; на склонѣ же южномъ не достигаютъ того же перевала лишь на 200—300 футовъ. Теперь, во время нашего прохода (въ половинѣ мая) растительная жизнь альпійской области ещё вовсе не пробуждалась. По ущелью же Номохунъ-гола, въ среднемъ поясѣ горъ, мы встрѣтили цвѣтушіе кусты (7—9 футовъ вышины) *балга-мото* (*Muricaria germanica* var. *squamosa*), которое восходитъ здѣсь до 11¹/₂ т. футовъ абсолютной высоты ²⁾; затѣмъ въ ничтожномъ количествѣ найдены были въ цвѣту два вида *касатика* (*Iris Bungei*, *Iris Tigridia* var. *flavescens*), *одуванчикъ* (*Taraxacum* sp.), *твердочашечникъ* (*Androsace tapete* n. sp.) и *первоцвѣтъ* (*Primula pumilio*). Вообще свѣжей зелени даже въ среднемъ поясѣ описываемыхъ горъ было еще очень мало. По Номохунъ-голу, вверхъ отъ 11¹/₂ т. фут., еще держались большіе пласты льда, а на самомъ перевалѣ лежалъ глубокий снѣжный сугробъ. Однако всѣ окрестныя нашему пути горы были свободны отъ зимняго снѣга, который, впрочемъ, и выпадаетъ здѣсь лишь въ незначительномъ количествѣ.

Изъ звѣрей, по ущелью Номохунъ-гола, мы видѣли *куку-ямановъ* (*Pseudois Nahoar*), *волковъ*, *зайцевъ* и *тарабагановъ* (*Arctomys robustus*); на перевалѣ и за переваломъ попались, впервые за нынѣшнее путешествіе, два небольшіихъ стада *дикихъ яковъ* (*Oeophagus mutus* n. sp.). Изъ птицъ встрѣчались по ущелью: *горихвостки* (*Ruticilla rufiventris*), *гор-*

¹⁾ Какъ, напримѣръ, по ущелью перевала, пройденнаго нами въ 1872 и 1873 гг., и по ущелью западнаго Номохунъ-гола.

²⁾ По ущелью западнаго Номохунъ-гола кустарникъ балга-мото, постепенно мельчая, восходитъ до 13 т. фут. абс. высоты.