

которыя затѣмъ размываются лѣтними дождями и выдуваются зимними бурями. Но тѣ и другія сносятъ лишь мягкій, поверхностный слой почвы, подъ которымъ всегда лежатъ болѣе крупныя обломки горныхъ породъ. Поэтому всѣ озерки на мото-ширикахъ неглубоки—отъ 1—2 рѣже до 3 футовъ.

Другой, повидимому, ничтожный звѣрекъ, но играющій большую роль въ переработкѣ почвы сѣверо-восточнаго Тибета—это *пищуха* (*Lagomys ladacensis*), о которой было уже говорено въ предыдущей главѣ. Безчисленное количество этихъ пищухъ нерѣдко сплошь дырявятъ своими норами обширныя площади на тибетскомъ плато. Осыпавшіяся или залитыя дождемъ норы постоянно замѣняются новыми. Вырытая же рыхлая глина уносится вѣтромъ, или смывается съ горныхъ склоновъ дождями—остаются оголенные мѣста и болѣе или менѣе значительныя ямки. Затѣмъ сами звѣрьки, выкапывая корни травы, также рыхлятъ и обезображиваютъ почву. Вотъ почему во всемъ сѣверо-восточномъ Тибетѣ такъ часто встрѣчаются, въ особенности на горныхъ склонахъ, голыя плѣши и нѣтъ нѣсколькихъ квадратныхъ саженъ ровной луговой поверхности. Кромѣ того, работа пищухъ, въ связи съ атмосферными дѣятелями, уже уничтожившими въ сѣверномъ Тибетѣ почти всѣ скалы, вѣроятно понемногу, въ теченіе вѣковъ, способствуетъ засыпанію горныхъ долинъ и черезъ то сглаживанію рельефа страны.

Болотистый характеръ описываемаго плато не прерывается до самаго водораздѣла къ бассейну Ды-чю, т. е. къ верховью Голубой рѣки. Этотъ водораздѣлъ образуется восточнымъ продолженіемъ хребта Баянъ-хара-ула; по нашему же пути обозначался лишь небольшимъ горбылемъ съ абсол. высотой въ 14,700 футовъ. Жителей на плато къ югу отъ Одонъ-талà, также какъ и къ сѣверу отъ этой котловины, нѣтъ вовсе. Что касается до флоры и фауны той же мѣстности, то онѣ одинаковы съ другими частями сѣвернаго или, вѣрнѣе, сѣверо-восточнаго Тибета. Общая характеристика здѣшняго растительнаго и животнаго царствъ сдѣлана въ описаніи моего «Третьяго путешествія», стр. 188—197. Теперь добавлю лишь вновь добытыя частности.

Флора.

Относительно своей весенней флоры плато сѣверо-восточнаго Тибета представляетъ большую бѣдность. Даже въ концѣ мая зелень здѣсь почти не показывалась и все было сѣро, какъ зимою. Только кое-гдѣ на мото-ширикахъ боязливо выглядывалъ цвѣтушій *первоцвѣтъ* (*Primula nivalis* var. *farinosa*), а по косогорамъ на солнечномъ пригрѣвѣ иногда встрѣчались также цвѣтушіе *адонисы* (*Adonis coerulea*) и чуть замѣтный *мо-лочай* (*Euphorbia* sp.); на голыхъ глинистыхъ скатахъ горъ вразсыпную