

исподволь становится более мягкою въ своихъ рельефахъ и постепенно переходитъ къ однообразію тибетскаго плато.

Климатъ описываемой горной мѣстности отличается, какъ и для всего Тибета, своею суровостью. По словамъ туземцевъ, зимою выпадаетъ здѣсь глубокій снѣгъ<sup>1)</sup> и стоять (вѣроятно по ночамъ) сильные морозы; весною господствуютъ морозы и бури; лѣтомъ каждый день дождь или снѣгъ; осенью также мало бываетъ хорошей погоды. Относительно здѣшняго растительного и животнаго царствъ въ общемъ можно сказать, что по Ды-чю, какъ и по верхней Хуанъ-хѣ, высоко поднимается западно-китайская флора и фауна; но къ той и къ другой, въ особенности же къ послѣдней, примѣшаны виды, свойственные сѣверо-тибетскому плато. Впрочемъ, внизъ по Ды-чю эти виды, вѣроятно, скоро исчезаютъ и замѣняются специально китайскими или восточно-тибетскими; при томъ и разнообразіе формъ несомнѣнно быстро увеличивается.

Вѣроятно, вслѣдствіе близкаго сосѣдства тибетскаго плато, значительно отодвигающаго высоту снѣговой линіи для здѣшней широты, и болѣе южнаго положенія описываемой горной области, растительные въ ней пояса поднимаются гораздо выше, нежели въ бассейнѣ верхней Хуанъ-хѣ<sup>2)</sup>. Такъ, альпійскіе луга, правда, уже очень скучные, восходятъ на абсолютную высоту до 16 т. фут.; альпійскіе кустарники—*лоза* (*Salix* sp.), *таволма* (*Spiraea* sp.) и крошечная *жимолость* (*Lonicera parvifolia*?) поднимаются до  $14\frac{1}{2}$  т. фут.; немного ниже ихъ растетъ колючій *верблюжий хвостъ* (*Caragana jubata*); *можжевеловое дерево* (*Juniperus Pseudo-Sabina*) восходитъ до  $13\frac{1}{2}$  т. фут. Здѣсь-же появляются еще нѣкоторые кустарники: два вида *жимолости* (*Lonicera hispida*, *L. tigricola*), желтый *курильскій чай* (*Potentilla fruticosa* var.), *карагана* (*Caragana n. sp.*), встрѣчающаяся въ Монголіи; изрѣдка *барбарисъ* (*Berberis chinensis* var. *crataegina*), еще рѣже *смородина* (*Ribes* sp.), а по берегу самой Ды-чю—*бама-мото* (*Myricaria germanica* var. *daurica*). Другихъ древесныхъ или кустарниковыхъ породъ въ предѣлахъ нами обслѣдованныхъ, т. е. отъ спуска съ плато до лѣваго берега Ды-чю, гдѣ абс. высота 13,100 футовъ, нѣтъ вовсе. Травянистая же flora въ намѣченномъ раіонѣ хотя довольно разнообразна, но все-таки несравненно бѣднѣе, чѣмъ на горныхъ лугахъ верхней Хуанъ-хѣ. При томъ, конечно, вслѣдствіе высокаго поднятія надъ уровнемъ моря, здѣшняя растительность, даже въ первой трети іюня (при нашемъ слѣдованіи по этимъ мѣстамъ), мало была развита. Альпій-

<sup>1)</sup> На южныхъ склонахъ горъ снѣгъ, вѣроятно, не лежитъ, какъ и въ горахъ Гань-су.

<sup>2)</sup> См. мое «Третье путешествіе», стр. 406 въ выносѣ.