

п. sp.) весьма обыкновененъ. Много также по открытымъ горнымъ склонамъ ущелий *тарабагановъ* (*Arctomys robustus*) и *зайцевъ* (*Lepus* sp.); обыкновенны — *волкъ* и *лисица*; мѣстами множество *пищухъ* (*Lagomys ladacensis*) дырявятъ почву долинъ своими норами. Въ рѣдкихъ скалахъ верхняго горнаго пояса обильно держатся *куку-яманы* (*Pseudois Nahoor*); тамъ же встрѣчаются — *барсъ* (*Irbis* sp.) и *рысь* (*Linx* sp.). Последняя попадаетъ и на плато Тибета, гдѣ иногда даже днемъ ловить антилопъ оронгò¹⁾. Среди птицъ нѣсколько разнообразіе, хотя все-таки весьма бѣдно. Нами найдено, правда за короткое время пребыванія²⁾ въ описываемой горной области, 49 видовъ пернатыхъ, гнѣздящихся и осѣдлыхъ. Изъ нихъ лишь 15 видовъ свойственны исключительно западному Китаю и Гималаѣ; остальные обитаютъ также на сосѣднемъ плато и въ другихъ мѣстахъ Центральной Азии. Чаще другихъ встрѣчались: въ верхнемъ альпійскомъ поясѣ — *грифы* (*Gyps himalayensis*, *Gypaetus barbatus*), *улларъ* (*Megaloperdix thibetanus*), *клушица* (*Fregilus graculus*) и *горные вьюрки* (*Leucosticte haematopygia*, *Fringilla monticola*, *Montifringilla Adamsi*); по высокимъ тамъ же долинамъ — тибетскій и чернолобый *жаворонки* (*Melanocorypha maxima*, *Otocoris nigrifrons*), *земляные вьюрки* (*Onychospiza Taczanowskii*, *Pyrigilauda ruficollis*) и *Podoces humilis*; въ кустарной и лѣсной области — *горихвостки* (*Ruticilla rufiventris*, *R. frontalis*), *дроздъ Кесслера* (*Merula Kessleri*), *дубоносъ* (*Mycerobas carneipes*), *Carpodacus davidianus*, *кукушка* (*Cuculus conorinus*), *пѣночка* (*Abornis affinis*), *синица* (*Leptopoeile Sophiae*), *чечотка* (*Linota brevirostris*), *желтая пилица* (*Budytes citreola*), *завирушка* (*Accentor fulvescens*), *ласточка* (*Cotyle rupestris*, *Cecropis daurica*), *сорока* (*Pica bottanensis*), *коршунъ* (*Milvus melanotis*), *удодъ* (*Upupa epops*), *даурская галка* (*Monedula daurica*), *вѣронъ* (*Corvus corax*) и *си-фаньская куропатка* (*Perdix sifanica*).

Пресмыкающихся и земноводныхъ, какъ слѣдуетъ ожидать, очень мало въ суровой горной области. Мы добыли здѣсь лишь одинъ видъ *ящерицы* (*Phrynoscephalus* n. sp.), *лягушку* (*Rana* sp.), и одну *змѣю* (*Trigonoscephalus Blanfordii*). Рыбы также мало въ быстротекущихъ горныхъ рѣчкахъ, но въ самой Ды-чю довольно много. Всего въ пройденномъ горномъ районѣ нами добыто 7 видовъ рыбъ³⁾, а именно: въ р.

¹⁾ Такой случай мы видѣли на открытой долинѣ, въ половинѣ мая 1884 г. по пути отъ р. Алакь-норъ-голь къ Одонь-тала.

²⁾ Весь іюнь 1884 г.

³⁾ Изъ нихъ только одинъ былъ извѣстенъ; остальные шесть оказались новыми. При прежнихъ посѣщеніяхъ (въ январѣ 1873 г., въ октябрѣ и декабрѣ 1879 г.) на тибетскомъ плато той же Ды-чю, мы не могли поймать въ ней рыбы, по случаю зимняго времени года.