

что недавніе изжелта-сѣрые горные склоны, отъ глубокихъ долинъ вплоть до бесплодныхъ розсыпей верхняго пояса, теперь всюду позеленѣли; зелеными стали, наконецъ, и тѣ кустарники (*Salix* sp., *Spigaea* sp.), которые растутъ небольшими площадками въ нижнемъ поясѣ альпійской области. Но, какъ уже говорено было, флора описываемыхъ горъ, главнымъ образомъ, травянистая; при томъ же здѣшнія, какъ и другія альпійскія травы никогда не достигаютъ большаго роста, обыкновенно-же являются карликами въ нѣсколько дюймовъ вышины. Нѣтъ нигдѣ здѣсь густыхъ травянистыхъ зарослей даже по долинамъ; нѣтъ сплошнаго ковра цвѣтовъ, столь украшающихъ въ лѣтнюю пору года луга нашихъ странъ. Какъ и вообще въ горахъ, флора мѣстности описываемой довольно богата разнообразіемъ видовъ, но, сравнительно, бѣдна количествомъ экземпляровъ. Лишь кое-гдѣ на пространствѣ нѣсколькихъ квадратныхъ футовъ можно встрѣтить сплошныя пятна цвѣтовъ одного и того же вида; обыкновенно же здѣшніе цвѣты мало пестрятъ почву своими колерами и всегда являются въ разнообразномъ смѣшеніи породъ. Они обречены проводить свою кратковременную жизнь среди самыхъ неблагопріятныхъ климатическихъ условій. Но ни ночные морозы, ни снѣгъ, часто выпадающій въ верхнемъ горномъ поясѣ, ни постоянные почти холода, быстро смѣняющіеся жгучими лучами солнца, ничто это не можетъ погубить даже самыхъ нѣжныхъ видовъ—до того унаслѣдовали, черезъ длинный, конечно, рядъ генераций, горныя растенія способность примѣняться ко всѣмъ климатическимъ невздамъ своей родины.

Въ общемъ флора горъ лѣваго берега Ды-чю значительно сходствуетъ съ альпійскою флорою горной области верхняго теченія Желтой рѣки, хотя, конечно, въ разсматриваемомъ районѣ встрѣчаются и виды, исключительно свойственные сѣверо-восточному Тибету.

Изъ наиболѣе характерныхъ растеній, цвѣтшихъ во второй половинѣ іюня, можно отмѣтить: для нижняго горнаго пояса — всѣ поименованныя на стр. 170 кустарники, присоединивъ къ нимъ вьющійся по обрывамъ *ломоносъ* (*Clematis orientalis*); по луговымъ горнымъ склонамъ—альпійскую *хохлатку* (*Corydalis capnoides* var. *thibetica*), *мелколепестникъ* (*Erigeron uniflorus*), *буркунъ* (*Medicago platycarpus*), *крестовникъ* (*Senecio campestris*), голубой *макъ* (*Meconopsis racemosa*), *колокольчикъ* (*Campanula aristata*), *астрагалы* (*Astragalus scythropus*, *A. confertus*, *Astragalus* n. sp.), *Oxytropis kansuensis*, *Oxytropis heterophylla*, *Lloydia serotina*, *Parrya villosa* n. sp. etc.; по рѣчнымъ здѣсь долинамъ и по дну ущелій—разноцвѣтные *Oxytropis*, *мытникъ* (*Pedicularis amoena*?),