

бросались на нашъ бивуакъ, чтобы поживиться здѣсь разными остатками. Жадность грифовъ была на столько велика, что они не обращали вниманія на оставшихся еще возлѣ бивуака людей и не улетали иногда даже послѣ перваго выстрѣла. Наповажены они подобнымъ образомъ тангутами, которые, равно какъ и монголы, считаютъ грифа священной птицею и никогда его не убиваютъ.

Подвигаясь попрежнему весьма медленно, вслѣдствіе постоянно почти дурной погоды и трудности выучнымъ верблюдамъ ходить въ дикихъ горахъ, мы перешли еще одинъ высокій перевалъ и спустились на р. Бы-чю. По обоимъ склонамъ этого перевала, который лишь на 400 фута ниже Конъ-чюнъ-ла, теперь во множествѣ цвѣли въ верхнемъ поясѣ альпійскихъ луговъ и на сосѣднихъ розсыпяхъ — маленькая *буковница* (*Trollius pumilus*), желтая *хохлатка* (*Corydalis n. sp.*) и желтый *мытникъ* (*Pedicularis versicolor*); между ними разсыпаны были бѣлыя пятна *твердо-чашечника* (*Androsace tapete n. sp.*). Вообще растительность въ горахъ теперь находилась въ полномъ лѣтнемъ развитіи, и подножный кормъ, благодаря также отсутствію тангутскихъ стадъ, укочевавшихъ на другія мѣста, всюду былъ превосходный.

Вверхъ по Бы-чю мы прошли также очень удобно, ибо вода въ этой рѣкѣ, вѣроятно временно, стояла теперь значительно ниже, чѣмъ въ началѣ іюня. Донимали насъ только постоянные дожди, падавшіе всего чаще послѣ полудня и ночью. Всѣ дождевыя тучи приносились съ запада и нерѣдко были грозowymi; въ самомъ верхнемъ поясѣ горъ дождь замѣнялся снѣгомъ. Температура вообще была низка не только ночью, но и днемъ при облачной погодѣ. Зато мы вовсе не видѣли комаровъ, мошекъ или мухъ, словомъ, какихъ-либо мучающихъ насѣкомыхъ.

Охота за горными баранами.

На р. Бы-чю мы опять дневали на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ почти мѣсяць назадъ впервые встрѣтили насъ тангуты. Здѣсь высится большая, состоящая изъ сланца, мергеля и конгломерата, гора, на которой водится множество горныхъ барановъ; за ними рѣшено было поохотиться.

Этотъ звѣрь, называемый монголами *куку-яманъ*, тангутами *рнаа* а по тюркски *кукмекъ*, представляетъ собою характерное животное высококихъ горныхъ хребтовъ южной половины Центральной Азии; встрѣчается здѣсь часто и притомъ въ двухъ видахъ, научное названіе которыхъ — *Pseudois Burrehel* и *Pseudois Nahoer*. Впрочемъ, различіе этихъ видовъ не велико и заключается главнымъ образомъ въ измѣненномъ погибѣ роговъ, которые у *P. Nahoer* подняты своими концами вверхъ, тогда какъ у *P. Burrehel* направлены тѣми-же концами внизъ; однако