

sp., *Triticum cristatum?*, *Trisetum n. sp.*, *Poa? sp.*, *Poa trivialis*, *Elymus junceus*; два послѣдніе встрѣчаются кустиками по берегу самаго озера; тамъ же и кустарный чернобыльникъ (*Artemisia laciniata?*), а по небольшимъ скаламъ—*ломоносъ* (*Clematis orientalis var.*), *очитокъ* (*Sedum Rhodiola*) и *лукъ* (*Allium monadelphum*). По горнымъ склонамъ въ половинѣ іюля цвѣли: синяя и палевая *генціаны* (*Gentiana n. sp.*), альпійская *астра* (*Aster alpinus*), темно-розовый и желтый *мытникъ* (*Pedicularis labellata*, *Pedicularis n. sp.?*), палевый *Oxytropis sp.*, синий *лукъ* (*Allium cyaneum*), зеленоцвѣтный *прикрытъ* (*Aconitum Anthora*), два вида *чернобыльника* (*Artemisia rupestris?*, *A. macrobotrya?*), *Saussurea arvensis var.*, *Saussurea n. sp.*; мѣстами обилень былъ также *мышьякъ* (*Thermopsis alpina*), уже отцвѣтшій. По береговымъ мото-ширикамъ, которые здѣсь выглядываютъ лучше и покрыты другимъ видомъ *тибетской осоки* (*Kobresia? digyna n. sp.*), въ это время красовались: золотисто-желтые *Cremanthodium plantaginoides* и *Cremanthodium lineare*, *Saussurea pygmaea*, *Saussurea uniflora var. pumila* и *камнеломка* (*Saxifraga hirculus var. vestita*). Изъ кустарниковъ по горамъ встрѣчались лишь низенькіе (въ $\frac{1}{2}$ фута) кустики *бѣлолозника* (*Eurotia? n. sp.*); кромѣ того, на западномъ берегу оз. Экспедиціи мы нашли небольшую песчаную площадку, поросшую *талыникомъ* (*Salix sp.*) отъ 1—2, рѣже до 3 футовъ вышиною, да на р. Саломѣ встрѣтили крошечную ($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ ф.) *облепиху* (*Hippophaë rhamnoides*). Однако, несмотря на прекрасныя пастбищныя мѣста, тангуты на тѣхъ же озерахъ не живутъ, быть можетъ по причинѣ сравнительно открытой мѣстности, не представляющей надежнаго убѣжища при постоянныхъ взаимныхъ грабежахъ.

Рыбы въ обоихъ озерахъ очень много; вѣроятно, здѣсь тѣ же виды, которые водятся въ рр. Саломѣ и Джагынъ-голь¹⁾; быть можетъ есть и новые.

Изъ водяныхъ птицъ много гнѣздится *индѣйскихъ гусей* (*Anser indicus*) и частью большихъ *крахалей* (*Mergus merganser*); обильны также рѣчные *крачки* (*Sterna hirundo*) и обыкновенныя *чайки* (*Larus brunneiceps*); нерѣдки—*чайка-рыболовъ* (*Larus Ichthyaetus*), *чайка серебристая* (*Larus argentatus?*), *бакланы* (*Phalacrocorax carbo*) и *мурпаны* (*Casarca rutila*); но утокъ лѣтомъ нѣтъ вовсе. По береговымъ болотамъ много *куликовъ-красноножекъ* (*Totanus calidris*), а по степнымъ мѣстамъ—*тибетскихъ жавороночковъ* (*Calandrella thibetana*). Вообще, орнитологическая фауна здѣсь бѣдная, какъ и во всемъ Тибетѣ. Изъ насѣкомыхъ

¹⁾ Поименованные въ предыдущей главѣ; въ самыхъ озерахъ рыбы мы не добыли.