

Желтой рѣки, достигающіе здѣсь своей западной границы, каковы: *жимолость* (*Lonicera hispida*) и горная *лоза* (*Salix* sp.); изъ травъ же—*валериана* (*Valeriana officinalis*?), *мытники* (*Pedicularis ternata*, *P. longiflora*), *бубенчики* (*Adenophora*) трехъ видовъ и *астрагалъ* (*Astragalus scythropus*); по скаламъ растетъ не лѣкарств. *ревень* (*Rheum spiciforme*); кромѣ того, найдены были еще три вида *Saussurea* (*S. pulvinata*, *S. Przewalskii*?, *S. sylvatica*?).

Ниже лѣснаго и кустарнаго района сѣверный склонъ пройденной части Бурханъ-Будда дѣлается совершенно безплоднымъ. На голой, желтовато-бурой лёссовой почвѣ, которою засыпаны здѣсь всѣ горныя породы, произрастаютъ рѣдкими кустиками лишь *Reaumuria Kaschgarica* var. *Przewalskii*, *Reaumuria songarica*, *бударгана* (*Kalidium caspium*), *Halogeton glomeratus*, словомъ, растенія пустыни, да и тѣ встрѣчаются всего чаще на ближайшихъ къ Номохунъ-голу горныхъ скатахъ. Далѣе, возлѣ самой рѣки и по сосѣднимъ склонамъ горъ растутъ: *хармыкъ* (*Nitraria Schoberi*), *суакъ* (*Lucium chinense*, *L. turcomanicum*), *чагеранъ* (*Hedysarum multijugum*), *полынь* (*Artemisia* n. sp.), *Calimeris alyssoides* и *Calimeris altaica*—всѣ внизъ отъ 11½ т. фута абсол. высоты. Отсюда же берега самого Номохунъ-гола нерѣдко густо окаймлены саженными кустами *балга-мото* (*Muricaria germanica* var. *squamosa*), по которымъ вьется роскошный *ломоносъ* (*Clematis orientalis* var.). Кромѣ того въ узкой полосѣ орошенной почвы, въ особенности возлѣ ключей, встрѣчаются небольшія площадки, густо заросшія травами, среди которыхъ и въ заросляхъ балга-мото найдены были теперь цвѣтущими: *астрагалъ* (*Astragalus adsurgens*), *гентиана* (*Gentiana barbata*?), *ежесъмянка* (*Echinospermum* sp.), *очитокъ* (*Sedum Roborowskii*), *лактукъ* (*Lactuca tatarica*, *L. versicolor*), *лебеда* (*Chenopodium bryoniaefolium*?), *крестовый корень* (*Cnicus* sp.), *Saussurea crassifolia*, *Scorzonera divaricata*, *Acroptilon Picris*, нашъ обыкновенный *тминъ* (*Carum carvi*), *костеръ* (*Bromus japonicus*), *луговой ячмень* (*Hordeum pratense*), *сумочникъ* (*Capsella procumbens*), *полынь* (*Artemisia Sieversiana*, *Artemisia* n. sp.); кое-гдѣ торчали мясистые стебли *Супоториумъ соссинеумъ*, а на старыхъ стойбищахъ густо росли наши же сорныя травы—*жеруха* (*Lepidium latifolium*) и *лебеда* (*Chenopodium album*). Все это сопровождаетъ берегъ Номохунъ-гола еще версты на двѣ-три по выходѣ изъ горъ, затѣмъ исчезаетъ вмѣстѣ съ самою рѣкою, вода которой теряется въ почвѣ.

Птицъ въ пройденныхъ горахъ встрѣчалось, какъ и прежде, мало. Обыкновенны были лишь *горныя куропатки* (*Saccabis magna*), *стѣнолазы* (*Tichodroma muraria*), *сорокопуты* (*Lanius arenarius*), *бѣлая плисница* (*Motacilla paradoxa*) и *водяные дрозды* (*Cinclus kashmiriensis*).