

хорошо наѣзженная. Безъ такой тропинки пройти здѣсь невозможно; трудно также и безъ вожака, ибо поперечныя, ведущія къ кочевьямъ, тропинки нерѣдко пересѣкаютъ главную. Жителей по нашему пути нигдѣ не было. Они откочевали въ стороны изъ боязни разбойниковъ, которые грабятъ въ Цайдамѣ всего болѣе осенью.

На четвертыя сутки послѣ бури, круто перемѣнившей ясную и жаркую лѣтнюю погоду на прохладную и (сначала) облачную осеннюю, намъ пришлось испытать большую въ Цайдамѣ рѣдкость, именно сильный дождь, который шелъ съ полуночи до разсвѣта. Этотъ дождь такъ размочилъ солончаковую глину, что идти сдѣлалось весьма трудно—верблюды скользили и падали, къ нашимъ же сапогамъ липли тяжелые куски грязи. Едва доползли мы до Найджинъ-гола, куда казаки съ караваномъ лошадей пришли тремя сутками ранѣе. Общій нашъ бивуакъ былъ устроенъ теперь на р. *Дульцинъ-голь*, составляющей рукавъ Найджинъ-гола и теряющейся въ солончакахъ. Долина этого рукава, тамъ, гдѣ мы стояли, имѣла съ полверсты ширины, поросла кустарникомъ балга-мото и изобиловала ключами. Кромѣ *фазановъ* (*Phasianus Vlangalii*) здѣсь въ изобиліи водились *зайцы* (*Lepus* sp.); въ лёссовыхъ же обрывахъ (20—30 фут. вышиною), обставляющихъ бока названной долины, держались *филины* (*Bubo* sp.). Сама рѣка Найджинъ-голь¹⁾ протекаетъ двумя, вскорѣ, впрочемъ, соединяющимися рукавами; первый изъ нихъ лежитъ западнѣе Дульцинъ-гола въ разстояніи одной версты, а второй верстахъ въ трехъ еще далѣе. Оба эти рукава, по величинѣ, почти равны и имѣли при средней водѣ отъ 10—12 сажень ширины, глубину же на бродахъ въ 2 фута. Судя по береговымъ наносамъ, вода во время прибыли повышается здѣсь на 3—4 фута. Кустарниковъ на описываемыхъ рукавахъ нѣтъ. Рыбы въ нихъ много, такъ что западный рукавъ носить мѣстное названіе «Загасунъ-голь», т. е. рыба рѣка. Впрочемъ, мы нашли здѣсь лишь одинъ видъ *разщепохвоста* (*Schizopygopsis Eckloni* n. sp.), встрѣченный при третьемъ путешествіи въ р. Шуга на плато Тибета; въ ключахъ же добыли два вида *гольца* (*Nemachilus Stoliczkai*, *N. chondrostoma* n. sp.) и два вида *лубача* (*Diplophysa dispar* n. sp., *D. scleroptera* n. sp.). На лѣвомъ берегу обоихъ рукавовъ Найджинъ-гола находятся небольшія пашни монголовъ тайджинерскаго хошуна. Эти монголы живутъ также въ ур. *Галмыкъ*, которое лежитъ на западной сторонѣ вышеописанной рѣки и представ-

¹⁾ О верхнемъ и среднемъ теченіи этой рѣки см. «Третье путешествіе», стр. 297—302.