

ступает въ видѣ ключей подземная вода, сбывающая со снѣговыхъ вершинъ окраинныхъ сѣверныхъ и южныхъ горъ. Такимъ путемъ образовались лежавшія по нашему пути урошица—Гансы и Гасъ. Въ болѣе удаленныхъ отъ горъ частяхъ той же пустыни вѣроятно нѣтъ и подобныхъ оазисовъ; тамъ могильное царство въ полномъ смыслѣ этого слова.

Отъ небольшаго соленаго озерка *Гашунъ-норъ*, встрѣченного въ Нашъ путь по крайнемъ западномъ углу южно-цайдамскихъ солончаковъ, намъ предстоялъ безводный переходъ, какъ оказалось потомъ, въ 67 верстъ. Запасшись водою, мы прошли это разстояніе въ три приема: съ мѣста вышли въ полдень и ночевали, сдѣлавъ 25 верстъ; на слѣдующій день, пройдя еще 25 верстъ, отдыхали часа два и, наконецъ, въ поздня сумерки добрались въ довольно плодородное ур. Гансы. Верблюды все время оставались безъ корма; лошадямъ трижды дали по три пригоршни ячменя. Идти каравану было очень хорошо. Такъ и вездѣ въ Центральной Азіи—чѣмъ хуже и бесплоднѣе мѣстность, тѣмъ лучше по ней путь съ верблюдами и наоборотъ. Однако дорогою теперь не мало встрѣчалось костей барановъ и рогатаго скота. Тѣ и другіе гибнутъ здѣсь отъ безводія во время перекочевокъ тайджерскихъ монголовъ на нестравленный кормъ въ ур. Гансы.

Это урошище лежитъ на абс. высотѣ 9,300 футовъ среди бесплодной пустыни и представляетъ собою впадину, имѣющую около 50 верстъ въ окружности и вѣроятно нѣкогда бывшую дномъ озера. Теперь здѣсь находится только въ юго-восточной части небольшое соленое озерко, вода котораго пополняется маленькою рѣчкою, образующеюся изъ ключей. Ключи находятся также и въ западной части описываемой котловины. Почва здѣсь всюду солончаковая; мѣстами чистая соль занимаетъ порядочныя площади. Растительность возлѣ ключей и тамъ, где соли поменьше, довольно хорошая для Цайдама. Кроме *тростника*, здѣсь растетъ *колосникъ* (*Elymus*), нѣсколько видовъ мелкихъ злаковъ и *сложноцветныхъ*, кое-гдѣ попадается *хармыкъ*, но тамариска нѣть. Изъ птицъ мы встрѣтили небольшія стада запоздалыхъ пролетныхъ *утокъ* (*A. boschas*, *A. acuta*, *Querquedula circia*, *Fuligula cristata*) и пару, вѣроятно заблудившихся, *лебедей* (*Cygnus Bewickii?*); среди мѣстныхъ пернатыхъ найдены были *саксаулъные сойки* (*Podoces Hendersoni*) и два вида *жаворонковъ* (*Alauda arvensis?* *A. cheleensis?*); фазановъ здѣсь нѣть вовсе. Изъ млекопитающихъ въ Гансы держатся *хара-сумты* (*Antilope subgutturosa*); кроме того встрѣчаются мелкія полевки—*Arvicola sp.* *A. Blythyi*; первыя живутъ по болотамъ, послѣднія въ норахъ на сухихъ лугахъ возлѣ ключей.