

Южный склонъ хребта Московскаго, сколько кажется, расширеннаго близъ соединенія съ Токузь-дабаномъ, крутъ и обрывистъ, по крайней мѣрѣ въ своей восточной части; склонъ же сѣверный, хотя и крутой, но довольно ровный, въ особенности противъ наивысшей середины этихъ горъ. Здѣсь частыя бури Долины вѣтровъ засыпали многія ущелья, уничтожили скалы и вообще сгладили горный рельефъ. Впрочемъ, и на южномъ склонѣ Московскаго хребта скалъ сравнительно немного, что составляетъ также его характерную черту, какъ въ двухъ сосѣднихъ хребтахъ—Цайдамскомъ и Колумба, да и во многихъ другихъ на плато Тибета. Каменная порода, встрѣченная нами въ восточной и западной частяхъ описываемаго хребта, одна и та же—кремнистый сланецъ.

Съ южнаго склона ледниковъ горы Кремль вытекаетъ, какъ еще прежде говорено, р. Зайсанъ-Сайту. Что именно и куда течетъ съ того-же склона всей западной части Московскаго хребта—неизвѣстно. Съ сѣверной же его стороны, несмотря на обиліе здѣсь ледниковъ, не сбѣгаетъ ни одной рѣчки, хотя нѣсколько сухихъ рѣчныхъ руслъ, встрѣченныхъ нами зимою въ Долинѣ вѣтровъ, показывали, что лѣтомъ въ нихъ бываетъ вода во время рѣдкихъ дождей и таянія ледниковъ. Въ общемъ хребетъ Московскій весьма бесплоденъ, особенно на своемъ южномъ склонѣ. На сѣверномъ склонѣ тѣхъ же горъ, въ нижнемъ ихъ поясѣ, кое-гдѣ попадаются мелкіе злаки (*Carex*, *Avena*, *Ptilagrostis*), а также крошечныя *Oxytropis*, *Tanacetum*, *Androsace*, *Saussurea*, *Saxifraga*; двѣ послѣднія восходятъ до 15 т. фута абс. высоты. Изъ кустарниковъ на прорывѣ р. Зайсанъ-Сайту найдены были—какой-то бобовый, едва выползающій изъ земли, и *бѣлолозникъ*? (*Eurotia*?) въ $1\frac{1}{2}$ фута вышиною. Тибетской осоки (*Kobresia*), столь обильной по мото-ширикамъ сѣв.-вост. Тибета, здѣсь нѣтъ вовсе, какъ равно въ другихъ теперь описываемыхъ хребтахъ и прилежащихъ къ нимъ мѣстностяхъ. Нѣтъ и самихъ мото-шириковъ, т. е. кочковатыхъ болотъ, что опять таки служитъ вѣскимъ указаніемъ на отсутствіе періодическихъ лѣтнихъ дождей.

Фауна Московскаго хребта, какъ всей этой части Куэнъ-люня, весьма бѣдная и почти не разнится отъ фауны сѣв.-восточнаго Тибета. Изъ крупныхъ звѣрей въ описываемыхъ горахъ живутъ *хуланъ*, *аргам* (*Ovis Dalai-lamae* n. sp.), *куку-яман* и въ небольшомъ числѣ *дикіе яки*; водятся еще *волки*, *зайцы*, *тарабаган* и *мелкіе грызуны*. Птицъ встрѣчено было также очень мало какъ по числу видовъ, такъ и по количеству экземпляровъ. Тому главная причина бесплодіе мѣстности, частію и ужасный климатъ. Собственно въ горахъ попадались *грифы* (*Vultur monachus*), *ягнятники* (*Gypaetus barbatus*), *клушицы* (*Fregilus*