

давшіяся нами въ Долинѣ вѣтровъ. Барометръ же упалъ на 10 — 12 мм., сравнительно съ его показаніями на тѣхъ самыхъ мѣстахъ мѣсяцемъ ранѣе.

Другую характерную черту декабря составляла его весьма низкая температура: въ ночь съ 19-го на 20-ое число ртуть замерзла, а въ теченіе всего этого мѣсяца, морозъ на восходѣ солнца 8 разъ переходилъ за 30° , да, кромѣ того, 6 разъ былъ болѣе 25° ; даже въ 1 часъ по полудни термометръ упалъ до $-18,0^{\circ}$. Притомъ слѣдуетъ оговорить, что морозы могли бы быть еще сильнѣе, если бы по ночамъ почти постоянно не дулъ западный вѣтеръ. Однако, и при этомъ повышающемъ ночную температуру явленіи и при меньшей абсолютной высотѣ, средняя температура нынѣшняго декабря ($-15,5^{\circ}$) все-таки нѣсколько ниже, чѣмъ была средняя температура ($-14,5^{\circ}$) въ 1872 году того же мѣсяца, проведеннаго нами на плато сѣверо-восточнаго Тибета, по пути отъ рѣки Шуга до болота Хуйтунъ-ширикъ, между $13\frac{1}{2}$ —15 т. фут. абсолютной высоты, и лишь немного не достигаетъ средней температуры ($-16,3^{\circ}$) декабря 1879 г., когда мы были за хребтомъ Танъ-ла и на пути отсюда до хребта Думбуре на абсолютной высотѣ отъ $14\frac{1}{2}$ — $16\frac{1}{2}$ т. фут.

Снѣгъ въ описываемомъ мѣсяцѣ шелъ всего 5 разъ и только побѣлялъ землю; даже въ горахъ онъ выпадалъ не глубже чѣмъ на 1—2 дюйма. Въ долинахъ снѣгъ этотъ вскорѣ сдувало вѣтромъ, смѣшивало съ пескомъ и пылью, такъ что онъ быстро пропадалъ.

На другой день Новаго года я отправилъ двухъ казаковъ съ нѣсколькими вьючными верблюдами на складочный пунктъ, въ урочище Чѣнь-яръ. Сами же мы предприняли непродолжительную экскурсію по рѣкѣ Хатынь-занъ, чтобы выяснитъ окончательно расположеніе окрестныхъ ей хребтовъ и прослѣдить названную рѣку. Эта послѣдняя, какъ уже было говорено, зимою не добѣгаетъ версты на 10 до рѣки Зайсанъ-Сайту. Пройдя это разстояніе, мы встрѣтили широкія накипи льда, образуемая постояннымъ, небольшимъ притокомъ воды. По обоимъ берегамъ рѣки здѣсь густо растетъ *бама-мото* (*Muricaria*) и мѣстами *колосникъ* (*Elymus*); попадаются также *ломоносъ* (*Clematis*) и *Ephedra*, а на пескѣ колючій *Oxytropis*; въ кустарныхъ заросляхъ иногда выходятъ изъ подъ земли незамерзающіе ключи. Съ такимъ характеромъ Хатынь-занъ прорываетъ и хребетъ Цайдамскій короткимъ, но довольно широкимъ ущельемъ. Далѣе вверхъ, описываемая рѣка течетъ по широкой долинѣ, между хребтами Колумба на югѣ и Цайдамскимъ на сѣверѣ. Эта долина въ видѣ корридора, значительно повышающагося, притомъ изборожденнаго, по крайней мѣрѣ въ восточной своей части, гли-

Эккурсія на
рѣку Хатынь-
занъ.