

жетъ похвалиться обиліемъ и разнообразіемъ органической жизни. Въ особенности бѣдна флора описываемаго озера. Правда, оба раза мы были здѣсь раннею весною, когда растительность почти еще не пробуждалась, но по всѣмъ даннымъ и лѣтомъ на Лобъ-норѣ едва ли можно найти среди растений особенно лишнее противъ того, что состоитъ на лицо зимою. Тѣмъ болѣе, что въ другихъ частяхъ таримскаго бассейна, именно въ апрѣлѣ 1877 года, на всемъ нижнемъ Таримѣ и въ апрѣлѣ же 1885 г. на Черченской рѣкѣ, мы почти ничего не могли собрать для своего гербарія.

Вотъ списокъ найденныхъ нами на Лобъ-норѣ растений: въ самомъ озерѣ—*тростникъ* (*Phragmites communis*) наиболѣе здѣсь обильный, *ситовникъ* (*Scirpus*, sp.), который часто растетъ по неглубокимъ озеркамъ, *кула* (*Typha latifolia*) также довольно обыкновенная, *водяная сосенка* (*Hippuris vulgaris*), *частуха* (*Alisma* sp.) и *ряска* (*Lemna* sp.), встрѣчающіяся лишь изрѣдка; по берегамъ и ближайшимъ окрестностямъ: *солянка* (*Salicornia herbacea*) нерѣдко сплошными площадями, *ситникъ* (*Scirpus maritimus*) въ меньшемъ количествѣ и кое-гдѣ *Karelinia caspica*; затѣмъ кустарники—*кендырь* (*Arosunum venetum*, быть можетъ есть и *A. pictum*), изъ волоконъ котораго туземцы ткуть холсты для своей одежды, *тамарискъ* (*Tamarix laxa*) и *Halostachys caspia*<sup>1)</sup>. Всего слѣдовательно девять видовъ травъ и три или четыре вида кустарниковъ<sup>2)</sup>.

Фауна Лобъ-нора, какъ и во всей таримской котловинѣ, много сходствуетъ, по крайней мѣрѣ относительно млекопитающихъ и птицъ, съ фауною Западнаго Туркестана, не смотря на то, что обѣ эти страны раздѣляются громаднымъ Тянь-шанемъ. Отчасти та же фауна заключаетъ въ себѣ виды общіе для всей Гоби, но существенно разнится отъ соседней фауны тибетскаго нагорья. Затѣмъ имѣетъ немногіе виды спеціально ей свойственные—какъ напр. *Nesokia brachyura* n. sp., *Gerbillus Przewalskii* n. sp., *Podoces Biddulphi*, *Phasianus insignis* и др.<sup>3)</sup>. При этомъ нужно замѣтить, что зоологическія изысканія въ Восточномъ Туркестанѣ произведены до сихъ поръ лишь урывками<sup>4)</sup>, слѣдовательно не могутъ считаться достаточно полными. Хотя съ другой стороны

Фауна.

<sup>1)</sup> При первомъ на Лобъ-норѣ путешествіи это растеніе ошибочно было принято за саксауль, на который весьма походить. Кромѣ того для Лобъ-нора тогда поименованъ былъ *Butomus*, котораго нынѣ мы не нашли.

<sup>2)</sup> Колючки, туграки и джиды, обыкновенныхъ по Тариму, на Лобъ-норѣ нѣтъ вовсе.

<sup>3)</sup> Виды пресмыкающихся и рыбъ, свойственные восточной части таримскаго бассейна, будутъ подробно поименованы ниже.

<sup>4)</sup> Въ юго-западной части страны—англичанами (двѣ экспедиціи Форсайта къ Якубъ-беку въ началѣ семидесятыхъ годовъ); въ восточной—мною при двухъ здѣсь путешествіяхъ.