

ющихъ пернатыхъ обильнѣе на Таримѣ лишь *черногорлый дроздъ* (*Turdus atrogularis*); остальные попадаютъ въ незначительномъ количествѣ. Причина этому — недостатокъ корма. Въ оазисахъ зимовыхъ птицъ больше, но все-таки мало сравнительно съ тѣмъ, на что, повидимому, можно рассчитывать при безснѣжки и теплой здѣшней зимѣ. Относительно весенняго пролета на Лобъ-норѣ будетъ подробно рассказано въ слѣдующей главѣ; о птицахъ гнѣздящихся поговоримъ попутно при дальнѣйшемъ описаніи путешествія. Здѣсь же назову только наиболѣе характерные для Лобъ-нора и Тарима виды изъ осѣдлыхъ пернатыхъ ¹⁾.

Въ тростниковыхъ заросляхъ всюду въ изобиліи встрѣчается *усатая синица* (*Parus barbatus*) и два вида *камышевой овсянки* (*Syngramus schoeniclus*, *S. pyrrhuloides*); по окраинамъ тѣхъ же тростниковъ обыкновенно держится *фазанъ* (*Phasianus insignis*); на солончакахъ встрѣчаются стайки маленькихъ *жаворонковъ* (*Calandrella leucorhaea?*), между тѣмъ какъ крупный *хохлатый жаворонокъ* (*Galerita magna*) держится предпочтительно жилыхъ мѣстъ; здѣсь и нашъ *полевой воробей* (*Passer montanus*), вмѣстѣ съ своимъ собратомъ *Passer Stoliczkae*, который живетъ также въ тростникахъ Лобъ-нора и въ туграковыхъ лѣсахъ. *Черная ворона* (*Corvus sp.*), не рѣдко съ выцвѣтшими отъ жары и сухости въ коричневый цвѣтъ крыльями, на Лобъ-норѣ гнѣздится на тростникѣ за немнѣніемъ деревьевъ; между тѣмъ *ворона сѣрая* (*Corvus corpix*), весьма обыкновенная по оазисамъ западной части таримскаго бассейна, восточнѣе Хотанской рѣки составляетъ исключительную рѣдкость. На Лобъ-норѣ же встрѣчается и *дятелъ* (*Picus leptorrhynchus*), весьма обыкновенный въ туграковыхъ лѣсахъ Тарима; въ густыхъ заросляхъ колючки и тамариска почти всюду раздается звонкій свистъ *Rhopophilus deserti*; наконецъ въ мѣстахъ болѣе пустынныхъ держится бѣлохвостая *стенная сойка* (*Podoces Biddulphi*), специально принадлежащая бассейну Тарима.

Изъ класса пресмыкающихся въ той же восточной части таримской котловины найдены были нами 8 видовъ ящерицъ и 1 видъ змѣи.

¹⁾ Списокъ птицъ для нижняго Тарима и Лобъ-нора по даннымъ, добытымъ въ первое мое здѣсь путешествіе, помѣщенъ въ моемъ отчетѣ—«Отъ Кульджи за Тяньшань и на Лобъ-норѣ», стр. 21—24, 60, 62, 63. Необходимо только сдѣлать теперь въ немъ нѣкоторыя исправленія, именно: вмѣсто *Podoces tarimensis* n. sp. слѣдуетъ поставить *Podoces Biddulphi*; вмѣсто *Myophonus Temminckii*, неправильно опредѣленнаго по молодому экземпляру, — *Merula maxima*; вмѣсто *Passer ammodendri* — *Passer Stoliczkae*; еще прибавить слѣдуетъ случайно пропущеннаго *Phasianus insignis*. При томъ нужно оговорить, что списокъ пернатыхъ для восточной части таримскаго бассейна въ нынѣшнее наше путешествіе значительно пополнился.