

Собственно на Лобь-норѣ встрѣчены: *Phrynocephalus axillaris*, распространяющійся отсюда до Хотана и по Хотанской рѣкѣ въ Аксу; *Eremias Pylzowi*—къ западу до Хотана; *Stellio Stoliczkanus*, добытый нами близъ Лобь-нора въ оазисѣ Чархалыкѣ, далѣе встрѣченный въ оазисѣ Нія; затѣмъ два вида изъ семейства гекконовъ—*Teratoscincus Przewalskii*, тамъ же, гдѣ и предыдущій видъ, и *Alsophylax Przewalskii*—на Лобь-норѣ, по Черченской рѣкѣ и въ оазисѣ Черченъ. Помимо Лобь-нора изъ ящерицъ найдены: *Phrynocephalus Roborowskii n. sp.* въ оазисѣ Кэрія, въ предгорьяхъ Русскаго и Кэрійскаго хребтовъ; два, быть можетъ, новые вида *Eremias*, частью въ тѣхъ же мѣстахъ, кромѣ того въ Хотанѣ, на рр. Хотанекой и Аксуйской. Въ послѣднихъ мѣстностяхъ добытъ единственный видъ змѣи—*Tropidonotus hydrus*. Изъ земноводныхъ встрѣчена на нижнемъ Таримѣ, въ Чархалыкѣ, Нія, Хотанѣ и на Аксуйской рѣкѣ одна и та же жаба—*Bufo viridis*.

Среди рыбъ въ восточной части таримскаго бассейна нами найдено 13 видовъ (изъ нихъ 7 специально свойственные бассейну Тарима), принадлежащихъ къ двумъ семействамъ—карповыхъ (Cyprinoidae) и вьюновыхъ (Cobitidae), почти исключительно господствующихъ въ водахъ Центральной Азіи. При томъ среди всѣхъ вообще центрально-азиатскихъ рыбъ встрѣчается мало родовъ, за то большое разнообразіе видовъ. Такъ и на Лобь-норѣ съ Таримомъ: всѣ 13 видовъ здѣсь собранные принадлежатъ, по изслѣдованію г. Герценштейна, четыремъ родамъ—*Schizothorax*, *Aspiorrhynchus*, *Nemachilus* и *Diplophysa*.

На самомъ Лобь-норѣ добыто нами 7 видовъ рыбъ, 1 видъ на нижнемъ Таримѣ и 5 видовъ въ другихъ рѣкахъ таримской котловины. Семь лобь-норскихъ видовъ, встрѣчающихся, по всему вѣроятію, сполна и въ нижнемъ Таримѣ, слѣдующіе: *Aspiorrhynchus Przewalskii*, называемый туземцами *тазекъ-балыкъ*—новый родъ и видъ, установленные покойнымъ профессоромъ Кесслеромъ. Это самая крупная рыба здѣшнихъ мѣстностей; достигаетъ, какъ говорятъ, до полутора пудовъ вѣсомъ. По словамъ туземцевъ, держится болѣе въ Таримѣ; въ озера мало заходитъ. Ловятъ ее въ сѣти и на удочку; права хищнаго; мясо очень вкусное, напоминаетъ судака; найдена также въ Черченъ-дарьѣ. Далѣе слѣдуетъ 4 вида *маринки*, а именно: *Schizothorax lacustris*, *Sch. chrysochlorus*, *Sch. altior n. sp.*, *Sch. punctatus*. Держатся они преимущественно въ озерахъ. Наичаще встрѣчается *Schizothorax altior*, которую лобь-норцы зовутъ *отуръ-балыкъ* (средняя рыба); мясо ея довольно вкусно. Среди *Schizothorax punctatus* попадаются *нерѣдко* экземпляры съ закругленнымъ близъ хвоста туловищемъ и односторонне лишь развитымъ