

хвостовымъ плавникомъ. Лобъ-норцы не считаютъ такіе экземпляры уродами, но особымъ видомъ, который зовутъ *минлай-балыкъ*¹⁾. Еще видъ маринки—*Schizothorax microlepidotus* найденный нами въ 1877 году на нижнемъ Таримѣ, по всему вѣроятію, также встрѣчается въ Лобъ-норѣ. Наконецъ здѣсь и на нижнемъ Таримѣ водятся два вида гольца—*Nemachilus tarimensis*, *N. yarkandensis*; послѣдній встрѣчается также въ рр. Черченской, Кэрійской, Хотанской и Аксуйской; кромѣ того, найденъ былъ нами въ оазисѣ Са-чжеу.

Помимо вышепоименованныхъ рыбъ, восточной части таримскаго бассейна свойственны еще 5 видовъ: двѣ маринки—*Schizothorax latifrons n. sp.*, *Sch. malacorrhynchus n. sp.*, обѣ встрѣчаются въ Аксуйской рѣкѣ; два гольца—*Nemachilus bombifrons n. sp.*, *N. Strauchi n. sp.*; первый добытъ въ Черченской рѣкѣ, въ оазисѣ Нія, въ предгорьяхъ Кэрійскаго хребта и въ р. Аксуйской; послѣдній—въ рр. Черченской и Аксуйской. Наконецъ губачъ—*Diplophysa scleroptera n. sp.* нынѣ добытъ въ р. Аксуйской, а внѣ таримскаго бассейна найденъ въ Гань-су, Куку-норѣ, Цайдамѣ и сѣв.-вост. Тибетѣ.

По количеству, рыбы въ Лобъ-норѣ и въ Таримѣ вообще много. Однако лобъ-норцы жалуются на ея постепенное уменьшеніе, причиною чего считаютъ обмелѣніе ихъ озера. По словамъ тѣхъ же лобъ-норцевъ, мѣстная рыба ежегодно совершаетъ періодическіе переходы: лобъ-норская направляется вверхъ по Тариму; таримская же идетъ въ Лобъ-норъ; послѣдняя всегда бываетъ менѣе жирна, нежели первая.

Отъ животнаго міра Лобъ-нора перейдемъ къ его обитателямъ.

Нынѣшнее незначительное населеніе Лобъ-нора, равно какъ и нижняго Тарима, мало имѣетъ достовѣрныхъ преданій о своемъ прошломъ даже въ ближайшую къ намъ эпоху. О древнихъ же здѣсь временахъ скудныя свѣдѣнія почерпаются лишь изъ китайскихъ источниковъ. По нимъ извѣстно, что еще за столѣтіе до Р. Х. при открытіи Китаемъ сношеній съ бассейномъ Тарима, на Лобъ-норѣ существовало небольшое государство *Лэу-лань*, позднѣе называвшееся *Шань-шань*. Черезъ него пролегла потомъ главная дорога изъ Китая въ Хотанъ, Кашгаръ и далѣе въ западныя страны. Съ замѣною въ VII или VIII вѣкѣ по Р. Х.

Мѣстные жители.

¹⁾ Такіе же экземпляры попадаются, какъ говорили намъ туземцы, въ верхнемъ Таримѣ при сліяніи рр. Яркендской и Аксуйской. По словамъ лобъ-норцевъ, въ ихъ озерѣ и въ Таримѣ изрѣдка встрѣчается еще рыба, туловище которой по срединѣ выгнуто на подобіе сѣдла; поэтому ее называютъ *сегеръ-балыкъ* (сѣдло рыба). Длинною бываетъ до 1½ футовъ. Плаваетъ плохо. Добыть такой уродливый экземпляръ въ свою коллекцію намъ не удалось.